herpy

AGAMER

Ctenophorus pictus

Ctenophorus pictus er en liten, dagaktiv agam fra Australias tørre indre, der hannen om våren lyser i rødt, gult og blått. Den blir 18-25 cm, graver seg ned i sand og lever av insekter. Arten er en travel og rask terrarieøgle som krever et langt, sandig terrarium, sterk varme og UVB, men ikke mye høyde. Arten er svært kortlevd, og det finnes bare lite kunnskap om stell av akkurat denne.

Familie: Agamidae Engelsk: Painted Dragon Tidligere navn: *Amphibolurus pictus; Ctenophorus dudleyi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**8-16 g**
Levealder	**1-2 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken og halvørken**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**100 × 40 × 40 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2-4 egg**
Kull per år	**1-4**
Inkubasjon	**55-80 dager** ved 28-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste III**
EU-vedlegg	**Vedlegg C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par eller en liten gruppe på opptil tre voksne dyr skal ha et terrarium på minst 100 × 40 × 40 cm (lengde × bredde × høyde). Målet er lånt fra *Ctenophorus nuchalis*, som har samme levevis.

TEMPERATUR

Arten er en ørkenøgle og skal ha en stor temperaturforskjell.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være lav, omtrent 20-40 %; tallet er et anslag ut fra leveområdet. Terrariet skal ventileres godt og holdes tørt, og sanden må ikke bli fuktig, med unntak av eggleggingshjørnet.

LYS OG UVB

Dagaktive ørkenarter trenger sterkt lys og UVB. Ferguson-sonen er ikke fastlagt for arten; *C. nuchalis* hører til sone 3-4, og sone 3 er et godt utgangspunkt.

FÔRING

Arten spiser mest insekter, ofte maur og andre små leddyr i naturen, og enkelte dyr tar også plantedeler. I terrariet er sirisser og kakerlakker hovedfôret, med melorm og silkeorm som variasjon.

ATFERD OG HÅNDTERING

Dyret er raskt, nervøst og trekker seg raskt bort hvis det blir skremt. Håndtering er ikke nødvendig og stresser dyret. Hannen markerer territoriet sitt med hodenikk og armsvingninger.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia.