herpy

AGAMER

Leiolepis belliana

Leiolepis belliana er en bakkelevende, dagaktiv agame fra Sørøst-Asia som graver dype huler i sandjord. Den har gule flekker på ryggen og oransje og svarte tverrbånd på sidene, og den kan bre ut sidehuden som en sommerfugl. Arten blir 40-50 cm, mest hale, lever mest av insekter og krever et tørt terrarium med dypt, gravbart bunnsubstrat, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Engelsk: Common Butterfly Lizard Tidligere navn: *Leiolepis bellii; Uromastyx belliana* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**40-50 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Varmeplass	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-8 egg**
Inkubasjon	**55-75 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par må ha et terrarium på minst 120 × 60 × 50 cm (lengde × bredde × høyde). Gulvarealet er viktigst, for arten er bakkelevende, men høyden må rumme et dypt bunnsubstrat.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 35-37 °C. Følg med på dyrets atferd, og juster deretter. Luften i den varme enden er 30-35 °C, og den kjølige enden er 26-29 °C. Om natten faller temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Spraying er vanligvis ikke nødvendig, unntatt i svært tørre omgivelser. Dyret skal ha en skål med friskt vann, stor nok til å bade i.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i åpent landskap, så den trenger kraftig lys og UVB. Bruk et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solplassen.

FÔRING

Leiolepis belliana spiser mest insekter, men også planter. I naturen tas gresshopper, billelarver, sommerfugler og krabber, og dyrene spiser også gress og andre planter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og raskt og flykter ned i en hule når noe beveger seg. Det tåler håndtering dårlig. I naturen er dyrene monogame og deler hule med en partner. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.

NATURLIG UTBREDELSE

Thailand, Myanmar (Burma), Kambodsja, Vietnam, Malaysia og Indonesia.