herpy

AGAMER

Leiolepis ocellata

Leiolepis ocellata er en bakkelevende, dagaktiv agame fra det nordlige Thailand som graver huler i tørr løvfellende skog, gressmark og jorder. Den skiller seg fra *Leiolepis belliana* ved store, øyelignende flekker på ryggen, og hunnene har rød hake. Arten krever et terrarium med dypt, gravbart bunnsubstrat, kraftig varme og UVB, og i naturen ligger den i hulen i den kjølige tiden.

Familie: Agamidae Engelsk: Eyed Butterfly Agama Tidligere navn: *Leiolepis belliana ocellata* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**35-50 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**45-100 g**
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Varmeplass	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-8 egg**
Inkubasjon	**55-100 dager** ved 27-33 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Leiolepis ocellata*.
TEMPERATUR	Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme enden er 30-35 °C, og den kjølige enden er 26-29 °C. Om natten faller temperaturen til 20-25 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	I utbredelsesområdet svinger luftfuktigheten fra omtrent 50 % i den tørre tiden til over 80 % i regntiden. I terrariet passer 40-70 %.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler seg i åpent landskap, så den trenger kraftig lys og UVB. Bruk et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solplassen.
FÔRING	*Leiolepis ocellata* er altetende og spiser insekter og unge planteskudd. Gi sirisser, kakerlakker, gresshopper og melormer, og tilby mørkegrønne blader som løvetann, kålblader og sennepsgrønt samt blomster.
ATFERD OG HÅNDTERING	Dyret er sky og raskt og flykter ned i en hule når noe beveger seg. Det tåler håndtering dårlig. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis. To hanner må ikke settes sammen, for de kjemper.
NATURLIG UTBREDELSE	Thailand og Myanmar (Burma).

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/leiolepis-ocellata