herpy

AGAMER

Leiolepis reevesii

Leiolepis reevesii er en bakkelevende, dagaktiv agame fra Sør-Kina og Sørøst-Asia som graver huler i sandjord og kan bre ut sidehuden som en sommerfugl. Ryggen har tettsittende lyse flekker hvis mørke kanter danner et grovmasket nett. Arten blir opptil omtrent 50 cm, mest hale, går i dvale om vinteren og krever et tørt terrarium med dypt, gravbart bunnsubstrat, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Engelsk: Reeves' Butterfly Lizard Tidligere navn: *Uromastyx reveesii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-50 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Varmeplass	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**2-8 egg**
Inkubasjon	**55-100 dager** ved 27-33 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Leiolepis reevesii er en flattrykt, slank agame med avrundet hode, lang hale og små, kornete ryggskjell. Ryggen har mange tettsittende lyse flekker hvis mørke kanter danner et grovmasket nett. På sidene sitter oransje- til teglrøde og svarte tverrbånd som er mindre markante enn hos *Leiolepis belliana*. Det er 13-16 lårporer på hver side.

Kroppslengden fra snute til kloakk er opptil 15-17 cm, og enkelte angivelser går opp til 19 cm. Halen blir opptil 34 cm, så store dyr måler omtrent 50 cm til sammen. Hannene er større enn hunnene og har et større hode. Nyklekte unger måler knapt 4 cm fra snute til kloakk.

Arten ble beskrevet i 1831 som *Uromastyx reveesii* og er oppkalt etter John Reeves, en engelsk naturforsker som bodde i Kina fra 1812 til 1831. Slekten *Leiolepis* er taksonomisk komplisert. Grensen mot *L. belliana* er ikke helt skarp, og arten kan krysses med både *L. belliana* og *Leiolepis guttata*. Den rødbåndede formen *rubritaeniata* ble tidligere regnet som underart av *L. reevesii* og føres nå som selvstendig art, *Leiolepis rubritaeniata*. *L. reevesii* formerer seg kjønnet, men gjentatte krysninger mellom den og *L. guttata* har gitt opphav til slektens fire rene hunnarter. Ved kjøp er det verdt å forsikre seg om at dyret er riktig bestemt.

Utbredelse og leveområde

Leiolepis reevesii lever i Sør-Kina (Guangdong, Guangxi, Hainan og Macao), Vietnam, Kambodsja og Thailand. Typelokaliteten er bare angitt som Kina. Avgrensningen mot *Leiolepis belliana* og *Leiolepis rubritaeniata* gjør den nøyaktige utbredelsen i Sørøst-Asia usikker.

> **Naturlig utbredelse:** Kina, Vietnam, Kambodsja og Thailand.

LEVEOMRÅDE

Arten lever i åpne, varme områder med sandjord og spredt vegetasjon, der den graver huler som den bruker til skjul, overnatting og egglegging. Dyrene soler seg tett ved hulens inngang og flykter ned i den ved liten forstyrrelse.

Hainan har bare to årstider, en regntid og en tørketid. Likevel går dyrene i dvale fra slutten av november til begynnelsen av mars, og i den tiden ligger de i hulene og spiser ikke. Om sommeren er tarmfloraen preget av bakterier som bryter ned plantefibre, mens den om vinteren er tilpasset den lange fastetiden.

Les mer: Vinterdvale og årstider

Stell

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Leiolepis reevesii*. Terrarium, temperatur, fuktighet, lys og levetid bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den best kjente arten i slekten, som lever under lignende forhold.

Et par må ha et terrarium på minst 120 × 60 × 50 cm (lengde × bredde × høyde). Gulvarealet er viktigst, for arten er bakkelevende, men høyden må rumme et dypt bunnsubstrat. Et enkelt dyr kan klare seg med 90 × 45 × 45 cm.

Bunnsubstratet skal være minst 20 cm dypt og bestå av en blanding av sand og gjødselfri hagejord, slik at hulene holder. Det nederste laget er svakt fuktig, resten tørt. Legg flate steiner, kork og røtter, slik at dyret har solplasser og skjul, og fest dem slik at de ikke kan graves under og velte. Ventilasjonen må være god, og lokket må kunne låses, for dyrene er raske og sky.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme enden er 30-35 °C, og den kjølige enden er 26-29 °C. Om natten faller temperaturen til 20-25 °C.

Dyret må alltid kunne søke vekk fra varmen, ned i bunnsubstratet eller inn i et skjul. Bruk halogenspotter eller keramiske varmeelementer med gitter foran og en termostat. Mål med digitale termometre og et infrarødt termometer, og kontroller solplassen jevnlig. Et dyr som hele tiden søker skjul fra varmen, har det for varmt, og et dyr som ikke soler seg, har det for kaldt.

I naturen går arten i dvale om vinteren. Om en kjølig hvileperiode er nødvendig eller gunstig i terrariet, er ikke dokumentert. Et dyr som om vinteren trekker seg inn i hulen og slutter å spise, skal ikke tvinges til å spise, men veies jevnlig.

Les mer: Varme og temperatur

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste laget av bunnsubstratet holdes svakt fuktig, slik at hulene ikke faller sammen, men overflaten må ikke være våt, for det gir mugg. Dyret skal ha en skål med friskt vann, som fylles daglig.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i åpent landskap, så den trenger kraftig lys og UVB. Bruk et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solplassen. Ferguson-sonen er ikke fastlagt for slekten; sone 3 passer for en øgle som soler seg i åpent landskap. Kontroller avstanden med en UV-måler, og bytt rørene etter produsentens anvisning. Lyset skal være på 10-12 timer om dagen.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Leiolepis reevesii er altetende og spiser både insekter og planter, og plantefôden er en viktig del av kostholdet. Gi sirisser, kakerlakker, gresshopper og melormer, og tilby hver dag mørkegrønne blader som løvetann, kålblader og sennepsgrønt samt blomster. Frukt gis bare lite. Salat har nesten ingen næring og unngås.

Unger og voksne fôres hver dag med det dyret spiser på omtrent 10 minutter. Dryss insektene med kalk ved hver fôring og med et multivitamin med D3 én gang i uken. Variér fôret.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og raskt og flykter ned i en hule når noe beveger seg. Det tåler håndtering dårlig og passer best for en holder som vil observere et dyr som graver og soler seg.

Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis. To hanner må ikke settes sammen, for de kjemper. Gi rikelig med solplasser og skjul, og sett nye dyr i karantene.

Les mer: Karantene og hygiene

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Hannene er større enn hunnene og har et større hode, både absolutt og i forhold til kroppen. Begge kjønn har lårporer. Hunnene er kjønnsmodne fra en kroppslengde på omtrent 9 cm fra snute til kloakk; alderen ved kjønnsmodenhet er ikke dokumentert. En hunn må være fullt utvokst og i god hold før paring, for egglegging tapper henne for kalk og krefter.

PARRING

Arten formerer seg kjønnet. I naturen kommer dyrene frem fra vinterdvalen i begynnelsen av mars, og eggene legges fra april til juli. Hvordan paringen foregår i terrariet, og om en kjølig hvileperiode fremmer avlen, er ikke dokumentert. Hold paret sammen så lenge det går fredelig.

EGGLEGGING OG KULL

Hunnen legger 2-8 egg per kull, i gjennomsnitt 3-4, i en hule. I naturen legger hun ett kull i året mellom april og juli; i fangenskap kan hun legge flere kull i samme sesong. Antall egg avhenger ikke av hunnens størrelse, og små hunner legger relativt tyngre kull enn store. Gi hunnen mulighet til å grave en hule i dypt, svakt fuktig bunnsubstrat i terrariets varme ende. En hunn uten egnet sted kan holde tilbake eggene, og det er livsfarlig.

INKUBASJON

Eggene klekkes etter omtrent 70 dager ved 30 °C, etter 55 dager ved 33 °C og først etter omtrent 100 dager ved 27 °C. Flest egg klekkes ved 30 °C, og unger fra 27 °C løper dårligere enn unger fra varmere egg. I naturlige reir ligger temperaturen mest på 28-32 °C, så 30 °C er det beste valget. Temperaturen bestemmer ikke kjønnet. Grav eggene forsiktig opp uten å vende dem, og legg dem i fuktet vermikulitt i en lukket boks i en rugemaskin med termostat.

OPPDRETT AV UNGER

Ungene måler knapt 4 cm fra snute til kloakk når de klekkes. De må ha et eget terrarium med dypt bunnsubstrat og mange skjul. Fôr dem daglig med små insekter og fint oppskåret grønt, dryss med kalk, og gi UVB. Unger vokser raskt, og for lite kalk og UVB gir beinskjørhet.

Helse og vanlige feil

De fleste problemer skyldes feil i oppsettet. Hold særlig øye med:

- Beinskjørhet (metabolsk beinsykdom) når det mangler UVB eller kalk. Bløte kjever, skjelvende bein og skjeve lemmer er tegn; gi kraftig UVB og kalk på insektene.
- Vekttap i vinterhvilen. Det er normalt at dyret faster om vinteren, men veg det annenhver uke, og avbryt hvilen hvis det går merkbart ned i vekt.
- Eggleggingsvansker hos hunner uten dypt, fuktig gravesubstrat. En hunn med synlige egg som ikke legger dem, må til veterinær.
- Parasitter og mage-tarm-problemer hos nyinnkjøpte dyr. Få en avføringsprøve undersøkt i karantenen.
- Tarmstopp hvis dyret svelger store mengder løs sand. Et bunnsubstrat med jord som holder hulene, reduserer risikoen.
- Mugg og hudproblemer ved for vått bunnsubstrat.

Kontakt en veterinær hvis dyret er sløvt, slutter å spise utenfor vinterhvilen eller har vanskelig for å skifte hud.

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.