herpy

AGAMER

Leiolepis rubritaeniata

Leiolepis rubritaeniata er en bakkelevende, dagaktiv agame fra Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam som graver huler i sandjord og kan bre ut sidehuden som en sommerfugl. Den stelles som den nært beslektede *Leiolepis belliana*: et tørt terrarium med dypt, gravbart bunnsubstrat, kraftig varme og UVB. Det finnes bare lite kunnskap om akkurat denne arten, så de fleste tallene er hentet fra andre.

Familie: Agamidae Engelsk: Reeves' Butterfly Lizard Tidligere navn: *Leiolepis belliana rubritaeniata; Leiolepis reevesii rubritaeniata*
Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Varmeplass	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**3-8 egg**
Inkubasjon	**55-75 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Leiolepis rubritaeniata*. Tallene i veiledningen er hentet fra *Leiolepis belliana*, som har samme levevis og lever i samme type landskap.
TEMPERATUR	Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme enden er 30-35 °C, og den kjølige enden er 26-29 °C. Om natten faller temperaturen til 20-25 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Spraying er vanligvis ikke nødvendig. Dyret skal ha en skål med friskt vann, stor nok til å bade i, og skålen fylles daglig.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler seg i åpent landskap, så den trenger kraftig lys og UVB. Bruk et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solplassen.
FÔRING	Slekten *Leiolepis* er altetende, og *L. rubritaeniata* spiser både insekter og planter; fordelingen er ikke kjent for arten.
ATFERD OG HÅNDTERING	Dyret er sky og raskt og flykter ned i en hule når noe beveger seg. Det tåler håndtering dårlig. Hos slekten deler en hann og en hunn ofte hule. Dyrene kan holdes enkeltvis eller parvis.
NATURLIG UTBREDELSE	Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/leiolepis-rubritaeniata