herpy

AGAMER

Leiolepis triploida

Leiolepis triploida er en bakkelevende, dagaktiv agame fra Malayahalvøya der alle dyr er hunner. Arten har tre kromosomsett og formerer seg ved jomfrufødsel: eggene utvikles uten hann, og ungene er genetiske kopier av moren. Den er stor og svært langhalet, graver huler og krever et tørt terrarium med dypt bunnsubstrat, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Engelsk: Thai Butterfly Lizard Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-45 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Varmeplass	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-3 egg**
Inkubasjon	**55-100 dager** ved 27-33 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Datamangel (DD)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Leiolepis triploida*. Stellet bygger derfor på *Leiolepis belliana*, den best kjente arten i slekten. Arten er stor og svært langhalet, så terrariet må være romslig.

TEMPERATUR

Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 35-37 °C. Luften i den varme enden er 30-35 °C, og den kjølige enden er 26-29 °C. Om natten faller temperaturen til 20-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, og terrariet skal være tørt. Det nederste laget av bunnsubstratet holdes svakt fuktig, slik at hulene ikke faller sammen, men overflaten må ikke være våt, for det gir mugg.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler seg i åpent landskap, så den trenger kraftig lys og UVB. Bruk et rør eller en LED på 6.500 K over hele terrariet og et T5 HO UVB-rør på 10-12 % over solplassen.

FÔRING

Kostholdet er ikke undersøkt for *Leiolepis triploida*. Slektens arter spiser både planter og insekter, og hos flere av dem utgjør plantene hoveddelen.

ATFERD OG HÅNDTERING

Dyret er sky og raskt og flykter ned i en hule når noe beveger seg. Det tåler håndtering dårlig. Siden alle dyr er hunner, er det ingen risiko for kamper mellom hanner.

NATURLIG UTBREDELSE

Thailand og Malaysia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/leiolepis-triploida