herpy

AGAMER

Kinesisk vannagame

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus er en stor, grønn og semiakvatisk agame fra skogkledde vassdrag i Sørøst-Asia. Den blir opptil ca. 90 cm, hvorav over to tredjedeler er hale. Arten er dagaktiv, klatrer og dykker, og den krever et svært stort, høyt og fuktig terrarium med en dyp vanndel, sterk UVB og en varm solplass. Mange av dyrene i handelen er viltfangede.

Familie: Agamidae Engelsk: Chinese Water Dragon Tidligere navn: *Dilophyrus mentager* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**70-90 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**250-600 g**
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**180 × 90 × 180 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**21-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vanndel** dybde 15-30 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, planter og virveldyr**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-18 egg**
Inkubasjon	**60-75 dager** ved 29-31 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr må ha et terrarium på minst 180 × 90 × 180 cm (lengde × bredde × høyde). Arten er stor og aktiv, klatrer og svømmer, og i et mindre terrarium blir den stresset og skader seg.

TEMPERATUR
Solplassen skal være 35-40 °C, målt med et digitalt termometer på selve greina. Oppgavene svinger fra ca. 32 til ca. 50 °C, og unger klarer seg best i den lave enden. Luften i den kjølige enden skal være 25-28 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal være 60-80 %, høyest om morgenen (ca. 75-80 %) og lavere om kvelden (ca. 50-60 %). Det oppnås med 1-2 daglige sprøytinger eller et automatisk regnanlegg, en fuktig bunn og en stor vanndel.

VANN OG VANNKVALITET
Vanndelen må være så stor at dyret kan dykke og svømme: minst 15 cm dyp, gjerne mer, og den skal dekke en tredjedel til halvparten av bunnen. Arten kan ligge lenge under vann og sover noen ganger i vannet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og må ha sterk UVB tilsvarende Ferguson-sone 3. Bruk et T5 HO-rør på 10-12 % UVB i en reflekterende armatur på samme side som varmelampene.

FÔRING
Physignathus cocincinus er altetende, men lever mest av insekter. Unge dyr spiser nesten bare insekter, og med alderen kommer det flere planter til. Unger under 3 måneder: små sirisser hver dag.

ATFERD OG HÅNDTERING
Physignathus cocincinus er sky og stressfølsom, særlig viltfangede dyr. La et nytt dyr falle til ro uten håndtering, og begynn deretter å gi fôr fra en pinsett, slik at dyret kommer bort til deg.

NATURLIG UTBREDELSE
Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja og Thailand.