herpy

AGAMER

Pogona barbata

Pogona barbata er en av de største skjeggagamene: en kraftig, dagaktiv agame på 50-65 cm fra Australias østlige skoger og kratt, med et velutviklet, mørkt skjegg og gult munninnvendig. Den er mer territoriell enn *Pogona vitticeps*, klatrer gjerne og krever et stort terrarium, kraftig varme og UVB.

Familie: Agamidae Engelsk: Eastern Bearded Dragon Tidligere navn: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*
Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**50-65 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**180 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-37 °C**
Varmeplass	**42-45 °C**
Temperatur, natt	**12-24 °C**
Luftfuktighet	**30-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**15-35 egg**
Kull per år	**2-3**
Inkubasjon	**55-75 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Stellet av *P. barbata* er bare sparsomt beskrevet for arten selv.

TEMPERATUR
Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 42-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme flekken skal være minst like stor som hele dyret inkludert halen.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal i gjennomsnitt ligge på 30-60 %, målt i den kjølige enden. Den varierer naturlig: lavere ved solplassen, høyere om natten og ved vannet.

LYS OG UVB
Pogona barbata er avhengig av kraftig, hvitt lys, som fremmer appetitt og aktivitet. Terrariet må være svært lyst, og solplassen skal være det lyseste stedet.

FÔRING
P. barbata er altetende. I naturen består føden av insekter, ormer, små virveldyr og plantedeler. Unge dyr får mest insekter og voksne mest planter.

ATFERD OG HÅNDTERING
Pogona barbata er territoriell og viser det tydeligere enn *Pogona vitticeps*. Et svart, utspilt skjegg, åpen munn med det gule innvendige, hvesing og et lite hopp mot motstanderen er trusler.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/pogona-barbata