herpy

AGAMER

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni er den minste skjeggagamen: en lav, kompakt agame på høyst ca. 30 cm fra de trefrie, svarte leirjordsslettene i det sentrale Queensland, med et svakt skjegg og et kort, butt hode. Den er dagaktiv, rolig og klarer seg med langt mindre plass enn *Pogona vitticeps*, men har de samme behovene for varme, kraftig UVB og et underlag å grave i, og blir 10-15 år.

Familie: Agamidae Engelsk: Black-soil Bearded Dragon Tidligere navn: *Pogona brevis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**25-30 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Varmeplass	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**12-24 mnd.**
Kullstørrelse	**5-19 egg**
Kull per år	**2**
Inkubasjon	**58-64 dager** ved 29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et enkelt voksent dyr trenger et terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm, og mer plass blir brukt. En liten gruppe, f.eks. en hann med en eller flere hunner, krever minst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 38-45 °C, målt med et infrarødt termometer på steinen. Den kjølige enden skal være 24-29 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN
Luftfuktigheten skal i gjennomsnitt ligge på 30-50 %, målt midt i terrariet med et digitalt hygrometer. Korte svingninger opp eller ned er ufarlige. Stillestående luft og fuktig bunn gir sykdom, så terrariet må være godt ventilert.

LYS OG UVB
P. henrylawsoni er dagaktiv og trenger mye klart, hvitt lys og kraftig UVB. Bruk et T5 HO-rør på 10-12 % UVB i en reflekterende armatur på samme side som varmelampen.

FÔRING
P. henrylawsoni er altetende og spiser mest insekter og bladgrønt. Nyklekte (under 3 måneder): insekter 2-3 ganger daglig og grønt daglig. Unge (3-7 måneder): insekter to ganger daglig og grønt daglig.

ATFERD OG HÅNDTERING
P. henrylawsoni er rolig og tåler forsiktig håndtering, men liker ikke å bli holdt fast eller vendt på ryggen og sprattler hvis det skjer.

NATURLIG UTBREDELSE
Australia.