herpy

AGAMER

## Abrolhos Bearded Dragon

# *Pogona minima*

*Pogona minima* er en liten, dagaktiv skjeggagame som bare lever på Wallabi-øyene i Houtman Abrolhos utenfor kysten av Western Australia. Den er omtrent 11 cm fra snute til kloakk, har lange bein og hale og bare et svakt skjegg. Det finnes nesten ingen erfaringer med stell, så veiledningen bygger på de nærmeste slektningene.

Familie: Agamidae  Tidligere navn: *Amphibolurus barbatus minimus; Amphibolurus minimus; Pogona minor minima*

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **25-30 cm**<br>total lengde inkl. hale |
| Levealder | **10-15 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Bakkelevende og gravende** |
| Biotop | **Halvørken** |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H for 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **24-37 °C** |
| Varmeplass | **40-45 °C** |
| Temperatur, natt | **13-24 °C** |
| Luftfuktighet | **30-50 %** |
| Vann | **Vannskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-sone 3 |
| Kosthold | **Insekter og planter** |
| Holdes | **Alene** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kullstørrelse | **5-19 egg** |
| Inkubasjon | **58-64 dager**<br>ved 29 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke listet** |
| EU-vedlegg | **Ikke listet** |
| IUCN | **Ikke vurdert (NE)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Pogona minima*, og arten er nesten ikke beskrevet fra fangenskap. Tallene for terrarium, temperatur, fuktighet, lys, fôr og levealder er lånt fra *Pogona minor* og *Pogona vitticeps*.

**TEMPERATUR**

Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme flekken må være minst like stor som hele dyret.

**LUFTFUKTIGHET OG VANN**

Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, målt i den kjølige enden, og terrariet må kunne tørke opp. Stillestående, våt luft og våt bunn gir sykdom.

**LYS OG UVB**

*Pogona minima* er dagaktiv og må ha kraftig, hvitt lys. Solplassen skal være det lyseste stedet, og 75-100 % av terrariets lengde bør være opplyst. UVB er nødvendig, og arten regnes som slektens øvrige arter for Ferguson-sone 3.

**FÔRING**

*Pogona minima* fôres som *Pogona minor*: mest insekter og en mindre del grønnsaker. Nyklekte (under 3 måneder): insekter 2-3 ganger daglig og grønnsaker daglig. Unge (3-12 måneder): insekter og grønnsaker daglig.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

*Pogona minima* er dagaktiv og soler seg mye. Kroppsspråket kjennes fra andre skjeggagamer: hodenikking overfor rivaler og vinking med et framben som tegn på underkastelse. Skjeggvisningen er svak, fordi skjegget er lite utviklet.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Australia.