herpy

AGAMER

Pogona minor

Pogona minor er en mellomstor, forholdsvis slank og dagaktiv skjeggagame på 30-40 cm fra det sørvestlige og sentrale Australia, med bare et svakt skjegg av små pigger. Den lever i sanddyner, kratt og tørre skoger, spiser mest insekter og legger flere små kull egg i året.

Familie: Agamidae Engelsk: Western Bearded Dragon Tidligere navn: *Amphibolurus minor; Pogona loriae* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-37 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**13-24 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**5-19 egg**
Kull per år	**2-4**
Inkubasjon	**58-64 dager** ved 29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Stellet av *P. minor* er bare sparsomt beskrevet. Tallene for terrarium, temperatur, fuktighet, lys, fôr og levealder er lånt fra *Pogona vitticeps* og den mindre *Pogona henrylawsoni*.
TEMPERATUR	Varm opp med minst to halogenspotter over solplassen. Overflaten der skal være 40-45 °C målt med et infrarødt termometer, og den varme flekken skal være minst like stor som hele dyret.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, målt i den kjølige enden, og terrariet må kunne tørke opp, for arten lever i tørre strøk. Stillestående, fuktig luft og fuktig bunn gir sykdom.
LYS OG UVB	*Pogona minor* er avhengig av kraftig, hvitt lys, som fremmer appetitt og aktivitet. Solplassen skal være det lyseste stedet, og 75-100 % av terrariets lengde bør være opplyst.
FÔRING	*Pogona minor* er mest insektetende. I naturen utgjør insekter og andre smådyr omtrent 80 % av føden og plantedeler omtrent en femtedel. Nyklekte (under 3 måneder): insekter 2-3 ganger daglig og grønt daglig.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Pogona minor* er dagaktiv og soler seg mye. Dyret bruker kroppsspråk som andre skjeggagamer: Hannene nikker med hodet overfor rivaler, og vinking med et framben er et tegn på underkastelse.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.