herpy

AGAMER

Uromastyx acanthinura

Uromastyx acanthinura er en kraftig piggstjertagame fra de steinete og grusete delene av den nordlige Sahara. Den blir 30-43 cm og veier omkring 450 g, graver dype huler og lever mest av planter. Den krever et stort, varmt og tørt terrarium med dypt bunnsubstrat og kraftig UVB, og den kan leve i mer enn 20 år. Arten er territoriell og holdes alene.

Familie: Agamidae Engelsk: North-African Mastigure Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-43 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-24 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende, bakkelevende og gravende**
Biotop	**Ørken, halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Varmeplass	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**16-22 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Planter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**48 mnd.**
Kullstørrelse	**6-23 egg**
Kull per år	**1**
Inkubasjon	**56-84 dager** ved 33-34 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et voksent dyr skal ha et terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og større er bedre, for eksempel 150 × 60 × 60 cm til et stort dyr. Vanlige glassterrarier er for små.
TEMPERATUR	Solplassen skal ha en overflatetemperatur på 50-55 °C, målt med et infrarødt termometer rett under lampen. Den kjølige siden skal være 27-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten i terrariet skal være lav: omkring 20-30 %, målt ved bunnen på den kjølige siden. Vedvarende høy luftfuktighet gjør dyret sykt, så ikke sprøyt terrariet.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og krever kraftig lys. Bruk en LED-lampe eller et lysstoffrør på ca. 6500 K som dagslys ved siden av varmelampen.
FÔRING	Voksne dyr er nesten rene planteetere.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er utpreget territoriell: begge kjønn forsvarer området sitt, og i kamper biter dyrene hverandre i sidene, så det kan oppstå hvite arr. Selv kullsøsken angriper hverandre hvis de holdes sammen for lenge.
NATURLIG UTBREDELSE	Algerie, Tunisia og Libya.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/agamer/uromastyx-acanthinura