herpy

FIRFISLER

Fringe-fingered Lizard

Acanthodactylus erythrurus

Acanthodactylus erythrurus er en rask, slank øgle fra Iberia og Nordvest-Afrika med lange, frynsede tær, brun og grå tegning og rødlig hale hos unger og hunner i paringstiden. Arten blir 18-23 cm, lever av insekter og krever en dyp sandbunn, kraftig sollys og høy varme.

Familie: Lacertidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-23 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**100 × 50 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-35 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**15-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Vinterhvile	**10-15 °C** 8-12 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**10-18 mnd.**
Kullstørrelse	**1-8 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**35-60 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Acanthodactylus erythrurus*.
TEMPERATUR	*Acanthodactylus erythrurus* er svært varmekjær: aktive voksne dyr holder i naturen en kroppstemperatur på 32-38 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal ligge på 30-50 %, som på det tørre, åpne levestedet. Sanden skal være tørr, og bare sanden i leggekassen holdes fuktig, mens terrariet ellers holdes godt luftet.
LYS OG UVB	*Acanthodactylus erythrurus* er dagaktiv og soler seg mye, så terrariet må ha kraftig lys og UVB.
FÔRING	*Acanthodactylus erythrurus* spiser insekter og andre små leddyr, i naturen særlig maur. Gi en variert kost: små sirisser, gresshopper, melorm, kakerlakker, fluer, silkeorm og edderkopper, i størrelser dyret kan svelge hele.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Acanthodactylus erythrurus* er rask, årvåken og sky. Den graver seg ned i sanden ved fare og er vanskelig å få tak i. Unngå å gripe dyret; halen kastes av ved stress. Hannene er territorielle og kjemper om plassen.
NATURLIG UTBREDELSE	Spania, Portugal, Gibraltar, Marokko og Algerie.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/firfisler/acanthodactylus-erythrurus