herpy

FIRFISLER

Sandfirfisle

Lacerta agilis

Lacerta agilis er en kraftig, kortbeint og dagaktiv øgle fra sandige heier, sanddyner og solvendte skråninger. Arten lever fra Sør-England til Bajkalsjøen, og hannen får skinnende grønne flanker i paringstiden. Den blir omtrent 20 cm, lever av insekter og trenger sol, en kald vinterdvale og helst en utendørs inngjerding.

Familie: Lacertidae Engelsk: Sand Lizard

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-12 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-30 °C**
Varmeplass	**38-45 °C**
Temperatur, natt	**12-17 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Vinterhvile	**4-6 °C** 4-16 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**24-36 mnd.**
Kullstørrelse	**4-15 egg**
Kull per år	**1-2**
Inkubasjon	**40-45 dager** ved 24-25 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Lacerta agilis trives best i et utendørs terrarium eller en inngjerding i full sol, der dyret får naturlig sollys, naturlig døgn- og årsrytme og levende byttedyr. Et par kan holdes i en inngjerding på 2 × 1 m.

TEMPERATUR

Lacerta agilis er et solelskende dyr. Dagtemperaturen i terrariet ligger på 22-30 °C, og solplassen skal ha en overflatetemperatur på 38-45 °C, målt med et infrarødt termometer.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Lacerta agilis kommer fra tørre, åpne levesteder, og luftfuktigheten i terrariet ligger på 40-60 %. God ventilasjon er viktigere enn fukt, og bunnen må ikke være konstant våt. I naturen får dyret væske fra morgendugg og regn.

LYS OG UVB

Lacerta agilis soler seg størstedelen av dagen og må ha kraftig lys og UVB. Utendørs kommer UVB fra sola. Innendørs brukes T5 HO-rør med UVB over solplassen, slik at lys, varme og UVB dekker samme område og er jevnt fordelt.

FÔRING

Lacerta agilis er en insekteter. I naturen består kosten av biller og larvene deres, gresshopper, sirisser, edderkopper, sommerfuglarver, skrukketroll og fluer. Maur unngås.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lacerta agilis er en enslig art som bare møter artsfeller for å pare seg. Hannene er territoriale og jager rivaler bort fra de beste solplassene. Et par eller en hann med to hunner per kvadratmeter er en rolig holdform.

NATURLIG UTBREDELSE

Storbritannia, Frankrike, Andorra, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Sveits, Liechtenstein, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, Italia, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Bulgaria, Hellas, Romania, Moldova, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Latvia, Estland, Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Tyrkia, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia og Kina.