herpy

FIRFISLER

Asian Grass Lizard

Takydromus sexlineatus

Takydromus sexlineatus er en slank, dagaktiv øgle med en uvanlig lang hale, som lever i høyt gress og lav vegetasjon i Sørøst-Asia. Den blir 20-30 cm, der det aller meste er hale, og lever av små insekter. Arten er tropisk og skal ikke ha vinterdvale, men den tørker raskt ut og krever en høy, tett beplantet innredning med moderat fuktighet.

Familie: Lacertidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**20-30 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-7 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**34-40 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-4 egg**
Kull per år	**2-5**
Inkubasjon	**40 dager** ved 26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et lite glassterrarium er for lite for *Takydromus sexlineatus*, selv om dyret er lite. Et par trenger minst 60 × 40 × 60 cm (lengde × bredde × høyde), og en hann med to hunner minst 90 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR

Gradienten er det viktigste. Dagtemperaturen er 25-30 °C, og på solplassen er overflaten 34-40 °C, målt med et infrarødt termometer. Det passer til kroppstemperaturen på 28-34 °C som dyrene selv velger.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal være 60-70 %. Sprøyt terrariet med vann to ganger om dagen, slik at dyrene kan drikke dråper fra bladene og veggene, og slik at luftfuktigheten holdes oppe.

LYS OG UVB

Takydromus sexlineatus er dagaktiv. Terrariet skal ha en liten varmespot og UVB-lys. UVB-lampen skal gi Ferguson-sone 2 (UV-indeks omkring 1-3 ved solplassen) og henge over en gren eller stein som dyrene soler seg på.

FÔRING

Takydromus sexlineatus er insektspiser og tar små levende insekter. Maten er små sirisser, fluer, bananfluer, spretthaler, melorm, voksmøllarver, små gresshopper og små kakerlakker.

ATFERD OG HÅNDTERING

Takydromus sexlineatus er rask, sky og et dyr for observasjon. Det skal ikke tas opp: halen kan kastes av ved pågripelse og gror bare delvis tilbake med en annen struktur, og dyrene er så raske at de lett slipper unna.

NATURLIG UTBREDELSE

India, Kina, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Kambodsja, Vietnam, Malaysia og Indonesia.