herpy

FROSKER

Nyctimystes infrafrenatus

Nyctimystes infrafrenatus er en stor, grønn trefrosk på 11-14 cm og regnes som verdens største trefrosk. Den lever i lavlandet på Ny-Guinea og omkringliggende øyer og i det nordøstlige Australia, ofte tett på mennesker. Den er rolig og sitter gjerne fremme, men trenger varme, et stort og høyt terrarium og en ordentlig vanndel.

Familie: Pelodryadidae Engelsk: White-lipped Tree Frog Tidligere navn: *Litoria infrafrenata* Publisert 15. november 2026

Mild hudgift

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**11-14 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**30-60 g**
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og våtmark**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**6-8 mnd.**
Egg per legging	**100-6 000**
Klekking	**1-2 dager**
Larvetid	**42-60 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 90 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-95 %**
Vann	**Vanndel** dybde 10-15 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

To voksne *N. infrafrenatus* kan holdes i et terrarium på 90 × 45 × 90 cm. Angivelsene varierer mye: fra 60 × 45 × 90 cm til ett dyr over et 90 cm akvarium til to-tre dyr til 60 × 50 × 90 cm til en gruppe på 5-8.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 20-22 °C om natten. Arten må holdes varm: lengre tids kulde under 15 °C er dødelig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Hold luftfuktigheten på 60-95 %, og overbrus terrariet daglig med regnvann eller avklort springvann.

VANN OG VANNKVALITET

N. infrafrenatus må ha en ordentlig vanndel på 10-15 cm; den holder på fuktigheten og er nødvendig hvis dyrene skal yngle. Den kan dekke en stor del av bunnen.

LYS OG UVB

Arten er overveiende nattaktiv, men hviler om dagen på steder med sollys, og hos dyr som er holdt helt uten UV-lys er det sett vekststans og misdannelser.

FÔRING

N. infrafrenatus spiser nesten alt som beveger seg og kan svelges: sirisser, kakerlakker, vandregresshopper, spyfluer, silkeormer og meitemark. Voksmøllarver og melormer er godbiter.

ATFERD OG HÅNDTERING

N. infrafrenatus er rolig og nysgjerrig og sitter ofte synlig fremme, også om dagen. Den hopper ikke mye, men venter på at et bytte skal komme forbi, og springer så de siste 10-15 cm.

NATURLIG UTBREDELSE

Australia, Indonesia og Papua Ny-Guinea.