herpy

FROSKER

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax er en slank, nattaktiv trefrosk på 4-9 cm fra Sørøst-Asia, som legger eggene i en skumrede ved vannet. Den er tilpasningsdyktig, lever gjerne tett på mennesker og er enkel å holde, men tåler ikke varme over 29 °C. Ynglingen settes i gang i et regnkammer.

Familie: Rhacophoridae Engelsk: Four-lined Tree Frog Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-9 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog, regnskog og våtmark**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I et skumreir**
Egg per legging	**100-400**
Klekking	**3-4 dager**
Larvetid	**49-70 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
To voksne *P. leucomystax* kan holdes i et glassterrarium på 45 × 45 × 60 cm, som rekker til 2-4 dyr. Et mindre terrarium på 60 × 30 × 40 cm kan huse tre dyr, men arten hopper langt og har glede av mer plass.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 23-27 °C om dagen og 18-22 °C om natten.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Hold luftfuktigheten på 60-70 %. Det klares med håndsprøyte, tåkeanlegg eller regnanlegg, flere ganger om dagen etter behov.

VANN OG VANNKVALITET
P. leucomystax skal alltid ha tilgang til rent vann i en stor, lav skål som er lett å holde ren, og som frosken lett kommer opp av.

LYS OG UVB
Arten trenger ikke annet lys enn det plantene krever. Det finnes ingen dokumentasjon på at den trenger UVB, men en svak UVB-kilde kan brukes til plantene og virker dessuten bakteriehemmende.

FÔRING
P. leucomystax er insektetere, og fårekyllinger kan være basisfôret, supplert flere ganger i måneden med voksmøllarver, silkeorm, møll, fluer, små meitemark og små kakerlakker.

ATFERD OG HÅNDTERING
P. leucomystax er nattaktiv og sitter om dagen skjult mellom planter og grener, men snapper gjerne et fôrdyr som kommer forbi. Den hopper langt og klatrer godt, men glir ikke i luften som noen av slektningene i familien.

NATURLIG UTBREDELSE
Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand.