herpy

FROSKER

Trachycephalus resinifictrix

Trachycephalus resinifictrix er en stor, kraftig og nattaktiv trefrosk fra trekronene i Amazonas. Ungdyrene er svart- og hvitstripete, de voksne marmorerte, og når den er truet, skiller frosken ut et melkehvitt hudsekret. Den yngler i vannfylte trehull, er robust i stell og minner på mange måter om *Ranoidea caerulea*.

Familie: Hylidae Engelsk: Amazon Milk Frog Tidligere navn: *Phrynohyas resinifictrix* Publisert 15. november 2026 **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-10 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**75 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-29 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-100 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Kjønnsmoden	**12-18 mnd.**
Egg per legging	**100-1 500**
Klekking	**1-2 dager**
Larvetid	**21-75 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Et voksent par kan holdes i et akvarium på omtrent 75 liter, og et terrarium på 75 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde) er nok til to til fire voksne, selv om mer plass alltid er bedre.

TEMPERATUR
Trachycephalus resinifictrix tåler et bredt temperaturspenn.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten er mindre kritisk enn temperaturen, men terrariet skal duskes minst én gang om dagen. Bruk avklort springvann eller osmosevann, som heller ikke gir kalkflekker på glasset.

VANN OG VANNKVALITET
Trachycephalus resinifictrix må ha en stor skål med rent vann, som tilsvarer trehullet i naturen. Skålen må være så stor at frosken kan sitte i den, og den brukes nesten hver natt, så ikke spar på størrelsen.

LYS OG UVB
Trachycephalus resinifictrix er nattaktiv og kan både leve og yngle uten UVB, men ungdyr som vokser opp med UVB, blir større og får et sunnere skjelett enn ungdyr uten. Derfor anbefales et svakt UVB-lys.

FÔRING
T. resinifictrix er grådig og sjelden kresen. Sirisser kan utgjøre størstedelen av kostholdet, og de skal være omtrent så lange som froskens hode er bredt.

ATFERD OG HÅNDTERING
T. resinifictrix er ikke et dyr for håndtering. Huden er gjennomtrengelig og følsom for olje og salter fra menneskehud, og hudsekretet kan irritere.

NATURLIG UTBREDELSE
Brasil, Fransk Guyana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru og Ecuador.