herpy

FROSKER

Blue-sided Treefrog

Agalychnis annae

Agalychnis annae er en 6-8 cm stor løvfrosk fra fjellskogene i Costa Rica: grønn på ryggen, med oransje øyne og himmelblå sider og lår. Den er nattaktiv, lever høyt oppe i vegetasjonen og er sårbar i naturen. Arten krever et kjølig og luftig terrarium: om dagen 20-24 °C og forholdsvis tørr luft, og først om kvelden dusjes det kraftig.

Familie: Phyllomedusidae Tidligere navn: *Phyllomedusa annae*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-18 °C**
Luftfuktighet	**50-75 %**
Vann	**Vannskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per legging	**47-162**
Klekking	**5-8 dager** ved 22-24 °C
Larvetid	**60-250 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite direkte pleiekunnskap om *Agalychnis annae*, og tallene her er derfor delvis lånt fra *Agalychnis moreletii*, som lever i samme høyde og i samme type fjellskog og har de samme kravene.

TEMPERATUR

Agalychnis annae kommer fra høyereliggende skoger enn de mer kjente løvfroskene og tåler ikke varme over lengre tid. Om dagen skal det være 20-24 °C, og temperaturen bør ikke komme over 25 °C, heller ikke kortvarig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten holdes på 50-75 % om dagen, mens froskene sover. Om kvelden, når lyset slukkes, dusjes terrariet kraftig, slik at luftfuktigheten stiger til 80-100 % og faller igjen i løpet av natten.

VANN OG VANNKVALITET

Det skal alltid stå en skål med rent vann i terrariet. En skål på omtrent 20 cm i diameter med 2-3 cm vann er nok, og froskene må lett kunne komme opp igjen; glatte steiner i skålen hindrer at mindre dyr drukner.

LYS OG UVB

UVB anbefales, fordi D-vitamin er nødvendig for kalkomsetningen, og insekter inneholder nesten ingenting. Ferguson-sone 3 er lånt fra *Agalychnis moreletii*: en gjennomsnittlig UV-indeks på 1-2,6 på de stedene der froskene hviler.

FÔRING

Agalychnis annae spiser bare insekter. Brune sirisser er det beste basisfôret, når de er fôret opp med næringsrikt fôr et par dager før froskene får dem. Også kakerlakker, voksmøllarver og stuefluer (og larvene deres) blir tatt.

ATFERD OG HÅNDTERING

Agalychnis annae sover om dagen på blader og er aktiv om natten. Den beveger seg langsomt og klatrer hånd over hånd, men hopper langt når den blir skremt, så åpne terrariet forsiktig.

NATURLIG UTBREDELSE

Costa Rica.