herpy

FROSKER

Black-eyed Leaf Frog

Agalychnis moreletii

Agalychnis moreletii er en 6-9 cm stor løvfrosk fra fjellskogene i Mexico og Mellom-Amerika: grønn på ryggen, med dypsvarte øyne og oransje sider og lår. Den er nattaktiv og lever høyt oppe i trærne. Den krever kjøligere og tørrere forhold enn de fleste slektningene: om dagen skal terrariet være tørt og under 24 °C, og først om kvelden sprayes det fuktig.

Familie: Phyllomedusidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-9 cm** snute-kloakk-lengde
Vekt	**6-25 g**
Levealder	**5-11 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Varmeplass	**25 °C**
Temperatur, natt	**15-18 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Egg per legging	**23-334**
Klekking	**7-11 dager** ved 20-24 °C
Larvetid	**60-100 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Agalychnis moreletii lever i trærne, så høyden er viktigere enn gulvarealet. Et terrarium på minst 45 × 45 × 60 cm rommer en liten gruppe på fire dyr.

TEMPERATUR

Agalychnis moreletii er en fjellart og skal holdes kjøligere enn den mer kjente *Agalychnis callidryas*. Om dagen skal det være 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Tørr luft om dagen er avgjørende for *Agalychnis moreletii*. Luftfuktigheten holdes på 50-70 % om dagen mens froskene sover, utenom yngletiden gjerne omtrent 60 %.

VANN OG VANNKVALITET

Det skal alltid stå en skål med rent vann i terrariet. En skål på omtrent 20 cm i diameter med 2-3 cm vann er nok, og froskene må lett kunne komme opp igjen.

LYS OG UVB

UVB anbefales, fordi D-vitamin er nødvendig for kalkomsetningen, og insekter inneholder nesten ingen.

FÔRING

Agalychnis moreletii spiser bare insekter. Brune sirisser (*Acheta domesticus*) er det beste basisfôret når de er fôret opp med næringsrik føde, for eksempel frukt, grønnsaker og revet gulrot, i 48 timer før froskene får dem.

ATFERD OG HÅNDTERING

Agalychnis moreletii sover om dagen på blader og er aktiv om natten. Den beveger seg langsomt og klatrer hånd over hånd, men hopper langt når den blir skremt, så åpne terrariet forsiktig.

NATURLIG UTBREDELSE

Mexico, Belize, Guatemala, Honduras og El Salvador.