herpy

FROSKER

Chaco Horned Frog

Chacophrys pierottii

Chacophrys pierottii er en liten, rund hornfrosk fra tørrskog og kratt i Gran Chaco i Sør-Amerika. Den blir 5-7 cm, graver seg ned i løs jord og tilbringer den tørre tiden i en kokong av avstøtt hud. Arten må bo alene, spiser mest insekter og ses sjelden i terrarier, så det finnes bare lite kunnskap om pleien.

Familie: Ceratophryidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**5-7 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**3-5 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Savanne og tørrskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 30 × 25 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter og mark/snegler**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per legging	**900-2 000**
Larvetid	**14 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om pleien av *Chacophrys pierottii*. Anbefalingene her er lånt fra *Ceratophrys cranwelli*, som lever i samme område og har samme kroppsbygning og levevis.

TEMPERATUR

På dagen holdes terrariet på 24-28 °C og om natten på 22-24 °C, som passer til den varme, regnfulle tiden da frosken er aktiv. Det er ikke behov for et varmepunkt, men en varmematte på siden av terrariet holder temperaturen stabil.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten holdes på 50-70 %. Substratet skal være lett fuktig hele veien ned. Sprøyt hver kveld, slik at de øverste centimeterne blir fuktige uten å stå i vann.

VANN OG VANNKVALITET

Gi en lav, bred vannskål der frosken kan sitte uten å måtte svømme og lett komme opp igjen; den tar opp vann gjennom huden. Bytt vannet daglig, og bruk springvann behandlet mot klor og kloramin.

LYS OG UVB

UVB er ikke nødvendig for *Chacophrys pierottii*, men et svakt UVB-rør (Ferguson-sone 1) gir en tydelig døgnrytme og gjør ingen skade så lenge frosken kan grave seg ned. Natten må være mørk.

FÔRING

Voksne dyr spiser i naturen mest insekter som biller, bier, maur og sommerfuglarver og en gang iblant andre frosker. Grunnfôret i fangenskap er sirisser, gresshopper, kakerlakker og voksmøllarver, gjerne avvekslet med meitemark.

ATFERD OG HÅNDTERING

Chacophrys pierottii er en einstøing som ligger nedgravd og stille i lang tid og slår til når byttet kommer forbi. Den er mest aktiv om natten.

NATURLIG UTBREDELSE

Argentina, Bolivia og Paraguay.