herpy

FROSKER

## Climbing Mantella

# *Mantella laevigata*

*Mantella laevigata* er en liten, dagaktiv frosk fra Madagaskars nordøstlige regnskoger og den eneste i slekten som klatrer. Den er svart med gul til lys grønn rygg og blå flekker på lemmene, blir 2-3 cm og formerer seg i vannfylte bambusrør og trehull, hvor hunnen fôrer rumpetrollet med ubefruktede egg. Den vil ha et høyt, fuktig og lunt terrarium med mange grener.

Familie: Mantellidae

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **2-3 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Vekt | **1,2-2 g** |
| Levealder | **4-8 år** |
| Aktiv | **Om dagen** |
| Levevis | **Trelevende og bakkelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fangenskap | **Ingen**<br>Oppdrettede dyr. Viltfangede dyr kan beholde giften lenge |
| Vanskelighetsgrad | **Øvet** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 50 × 100 cm**<br>L × B × H for 4 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **20-26 °C** |
| Temperatur, natt | **17-22 °C** |
| Luftfuktighet | **80-100 %** |
| Vann | **Vannskål**<br>dybde 1-2 cm |
| UVB | **Valgfritt**<br>Ferguson-sone 1 |
| Kosthold | **Små leddyr (spretthaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Parvis eller én hann med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Utvikling | **Rumpetroll i vann** |
| Egglegging | **I bladkar (f.eks. bromeliaer)** |
| Egg per legging | **1-3** |
| Klekking | **2-7 dager** |
| Larvetid | **90 dager**<br>fra klekking til metamorfose |
| Larvefôr | **Alger/planter, ubefruktede egg fra hunnen og andre rumpetroll** |
| Yngelpleie | **Vokter eggene og fôrer rumpetrollene med egg** |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Stell i korte trekk

**TERRARIET**

*Mantella laevigata* klatrer, så terrariet skal være høyt og innredet loddrett. Minstemålet til en gruppe på fire voksne dyr er 60 × 50 × 100 cm (lengde × bredde × høyde). Høyden betyr mer enn gulvarealet.

**TEMPERATUR**

Om dagen skal det være 20-26 °C, og om natten faller temperaturen 2-4 grader til 17-22 °C. Dagtemperaturen kan gjerne nå 27 °C, og i kortere perioder tåler arten opptil 30 °C og ned til 17-18 °C.

**LUFTFUKTIGHET OG DUSJING**

Luftfuktigheten skal være 80-100 %. Sprøyt terrariet med avklort vann eller regnvann hver dag, særlig i perioden da arten skal få avkom. Bunnen skal være fuktig, men aldri vannfylt.

**VANN OG VANNKVALITET**

Sett inn én eller flere lave vannskåler i terrariet, og hold dem alltid fylt. Dybden er 1-2 cm, slik at dyrene lett kommer opp.

**LYS OG UVB**

Lyset skal passe til plantene, men må ikke varme opp terrariet. Gi 10-12 timers dag og mørke om natten. Det er ikke dokumentert at arten trenger UVB; en svak UVB-lampe (Ferguson-sone 1) er valgfri og krever skygge og skjul.

**FÔRING**

Hovedfôret er små leddyr: spretthaler, bananfluer, nyklekte siriss, termitter og små maur. Unger får spretthaler. Fôr tre ganger i uken og gi så mye at dyrene har spist opp etter et par timer.

**ATFERD OG HÅNDTERING**

Hannene er forholdsvis dristige og kaller åpent for å forsvare territoriet sitt, mens hunnene er mer tilbaketrukne. Hannene kjemper om territorier med bryting, jakt og hopp.

**NATURLIG UTBREDELSE**

Madagaskar.