herpy

FROSKER

Red-banded Rubber Frog

Phrynomantis bifasciatus

Phrynomantis bifasciatus er en kompakt, glatt og skinnende frosk fra det sørlige og østlige Afrika. Den er svart med skarpe røde til kremfargede bånd, går mer enn den hopper, og spiser helst maur og andre små leddyr. Hudsekretet er giftig for andre frosker, så arten må ikke holdes sammen med andre arter.

Familie: Microhylidae Tidligere navn: *Phrynomerus bifasciatus* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-7 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Savanne**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per legging	**300-1 500**
Klekking	**4 dager**
Larvetid	**30-90 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Phrynomantis bifasciatus*, og anbefalingene bygger på artens leveområde og på de få erfaringene som finnes.

TEMPERATUR
Om dagen skal det være 24-29 °C, og om natten 20-23 °C. Arten kommer fra varmt, halvtørt land og trives best i den varme enden av spennet. Nattemperaturen er ikke kjent for arten; 20-23 °C passer til klimaet i utbredelsesområdet.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal være 50-70 %. Arten kommer fra tørt til fuktig savanneland og er mer tørketålende enn de fleste frosker, men den kan likevel tørke ut.

VANN OG VANNKVALITET
Sett en stor, lav skål med rent vann i terrariet, så stor at frosken kan ligge i den, og så lav at den lett kommer opp igjen. Amfibier tar opp vann og stoffer gjennom huden, så vannet må være uten klor og kloramin.

LYS OG UVB
Phrynomantis bifasciatus har ingen kjent bruk for UVB, men svakt UVB kan gis og gagner plantene. Vanlig terrarielys i 10-12 timer om dagen gir en tydelig døgnrytme. Gi rikelig med skjul, slik at froskene kan unngå lyset om dagen.

FÔRING
Phrynomantis bifasciatus har en liten munn og tar helst små byttedyr. I naturen består kosten mest av maur og termitter, men også andre små leddyr som gresshopper og edderkopper.

ATFERD OG HÅNDTERING
Phrynomantis bifasciatus er en rolig frosk som går og løper mer enn den hopper. Den er mest aktiv om kvelden og natten og gjemmer seg om dagen. Truet pumper den seg opp og viser de røde båndene.

NATURLIG UTBREDELSE
Kongo, Etiopia, Somalia, Kenya, Tanzania, Mosambik, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia, Angola, Sør-Afrika og Eswatini.