herpy

FROSKER

Four-lined Tree Frog

Polypedates leucomystax

Polypedates leucomystax er en slank, nattaktiv trefrosk på 4-9 cm fra Sørøst-Asia, som legger eggene i en skumrede ved vannet. Den er tilpasningsdyktig, lever gjerne tett på mennesker og er enkel å holde, men tåler ikke varme over 29 °C. Ynglingen settes i gang i et regnkammer.

Familie: Rhacophoridae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-9 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog, regnskog og våtmark**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I et skumreir**
Egg per legging	**100-400**
Klekking	**3-4 dager**
Larvetid	**49-70 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

To voksne *Polypedates leucomystax* trenger et glassterrarium på minst 45 × 45 × 60 cm, og det rekker til opptil fire dyr. Arten hopper langt og har nytte av mer plass.

TEMPERATUR

Hold terrariet på 23-27 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Den øvre grensen er viktig: over 29 °C kan raskt bli dødelig, særlig hvis frosken samtidig mangler vann eller fukt. En svak varmepære er nok hvis rommet er kjølig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Hold luftfuktigheten på 60-70 %. Det klares med håndsprøyte, tåkeanlegg eller regnanlegg, flere ganger om dagen etter behov.

VANN OG VANNKVALITET

P. leucomystax skal alltid ha tilgang til rent vann i en stor, lav skål som er lett å holde ren, og som frosken lett kommer opp av.

LYS OG UVB

Arten trenger ikke annet lys enn det plantene krever. Det finnes ingen dokumentasjon på at den trenger UVB, men en svak UVB-kilde kan brukes til plantene og virker dessuten bakteriehemmende.

FÔRING

P. leucomystax er insektetere, og fårekyllinger kan være basisfôret, supplert flere ganger i måneden med voksmøllarver, silkeorm, møll, fluer, små meitemark og små kakerlakker.

ATFERD OG HÅNDTERING

P. leucomystax er nattaktiv og sitter om dagen skjult mellom planter og grener, men snapper gjerne et fôrdyr som kommer forbi. Den hopper langt og klatrer godt, men glir ikke i luften som noen av slektningene i familien.

NATURLIG UTBREDELSE

Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand.