herpy

FROSKER

Black-webbed Treefrog

Rhacophorus kio

Rhacophorus kio er en stor, gressgrønn flygefrosk fra regnskogene i det sørlige Kina, Laos, Thailand og Vietnam. Hunnene blir opptil 8 cm. Svømmehuden er oransjegul med en svart flekk ved roten av hver finger og tå, og frosken spenner den ut når den glir mellom trærne. Arten er nattaktiv og sky, og det finnes bare lite kunnskap om pasning i fangenskap.

Familie: Rhacophoridae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vannskål** dybde 2-3 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I et skumreir**
Egg per legging	**130-180**
Klekking	**5 dager**
Larvetid	**45-85 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Rhacophorus kio*.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 21-24 °C om dagen, tilsvarende vanlig romtemperatur, og la det gjerne falle til 18-21 °C om natten. Korte perioder opptil 27-28 °C tåler frosken, men temperaturen må ikke komme over 28 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-90 %, lavest om dagen og høyest om natten. Sprøyt terrariet jevnlig med avklort springvann, regnvann eller osmosevann, og la det tørke litt opp i løpet av dagen, slik at luften ikke står stille.
VANN OG VANNKVALITET	Sett en stabil, lav vannskål i terrariet som frosken kan sitte i om natten. 2-3 cm vann er nok, slik at frosken lett kommer opp igjen. Skift vannet så snart det er skittent, og helst hver dag eller annenhver dag.
LYS OG UVB	Frosken er trelevende, og en svak UVB-kilde av den typen som brukes til tropiske skogdyr, anbefales. En lav UV-indeks på de øverste bladene (Ferguson-sone 1) er et forsiktig utgangspunkt.
FÔRING	*Rhacophorus kio* spiser levende insekter. Sirisser kan brukes hele livet, fra små nyklekte til store, supplert med små kakerlakker, soldatfluelarver og av og til en voksmøllarve som godbit.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er nattaktiv og sky og tilbringer dagen skjult mellom bladene; mesteparten av tiden sitter den på glasset eller på innredningen.
NATURLIG UTBREDELSE	Kina, Laos, Thailand og Vietnam.