herpy

FROSKER

Wallace's Flying Frog

Rhacophorus nigropalmatus

Rhacophorus nigropalmatus er en av de største flygefroskene og lever høyt oppe i regnskogen på Borneo, Sumatra og Malayahalvøya. Den er smaragdgrønn med svart svømmehud mellom fingre og tær, og med utspilt svømmehud kan den gli opptil 15 m mellom trærne. Hunnene blir opptil 10 cm. Arten krever et svært stort, høyt og varmt terrarium, og det finnes bare lite kunnskap om pasning og avl.

Familie: Rhacophoridae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**120 × 80 × 120 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vann	**Vanndel** dybde 10 cm
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I et skumreir**
Egg per legging	**800**
Larvetid	**42-85 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om pasningen av *Rhacophorus nigropalmatus*, og tallene her bygger på arten selv og på den nært beslektede *Rhacophorus reinwardtii*, som er mindre.
TEMPERATUR	Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 21-23 °C om natten. Det svarer til lavlandsregnskogen der arten lever, og temperaturen skal ikke komme over 30 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal ligge på 70-90 %. Sprøyt terrariet grundig hver dag med avklort springvann, regnvann eller osmosevann, og la det tørke litt opp i løpet av dagen.
VANN OG VANNKVALITET	Arten skal ha en fast vanndel som den kan sitte i og legge egg over. Vannet skal være 10 cm dypt, og frosken skal lett kunne komme opp igjen via greiner, kork og steiner.
LYS OG UVB	Frosken lever høyt oppe i tretoppene, og en svak UVB-kilde av den typen som brukes til tropiske skogdyr, anbefales.
FÔRING	*Rhacophorus nigropalmatus* spiser levende insekter.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er sky og nattaktiv og tilbringer dagen skjult mellom bladene, ofte sammenkrøpet tett på en gren eller på glasset. Om natten blir den aktiv, klatrer og glir.
NATURLIG UTBREDELSE	Thailand, Myanmar (Burma), Malaysia, Indonesia og Brunei.