herpy

FROSKER

Hill Garden Bug-eyed Frog

Theloderma asperum

Theloderma asperum er en liten, nattaktiv trefrosk fra skogene i Sørøst-Asia. Den er sortbrun med hvite vorter som ligner fuglelort, og har dypt rubinrøde øyne. Arten tåler mer varme enn de øvrige slektningene og trives i et lite, fuktig terrarium med en vanndel. Den roper ganske kraftig og holdes best i en liten gruppe.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Philautus asper*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog og fjellskog**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**75-95 %**
Vann	**Vanndel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Kjønnsmoden	**6-10 mnd.**
Egg per legging	**4-15**
Klekking	**7-14 dager**
Larvetid	**75-180 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Theloderma asperum er liten og kan holdes i et forholdsvis kompakt terrarium. Et terrarium på 45 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde) passer for en liten gruppe på fire dyr.

TEMPERATUR

Om dagen skal temperaturen være 20-24 °C, og om natten 17-21 °C. Arten tåler kortvarig ned til omtrent 10 °C og klarer 24-25 °C uten problemer, men over 27 °C blir det farlig og kan være dødelig.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING

Luftfuktigheten holdes på 75-95 %. Arten tåler korte perioder ned til omtrent 50 % hvis det er tilgang til vann, men tørr luft uten vann kan raskt være fatal.

VANN OG VANNKVALITET

Frosken oppholder seg mye ved vannkanten og sitter til og med under vann, så vanndelen er ikke til pynt. Gi en fast vanndel på 5-10 cm dybde med korkplater og korkrør, slik at både voksne og unger lett kan komme opp.

LYS OG UVB

Frosken er nattaktiv og har ikke dokumentert behov for UVB. Et svakt UVB-rør til skyggearter (Ferguson-sone 1) kan brukes og er valgfritt, men da må froskene alltid kunne trekke seg i skygge.

FÔRING

T. asperum spiser insekter. Små sirisser er det viktigste fôret, supplert med voksmøllarver, fluer, spretthaler til de minste ungene, små dubia-kakerlakker og soldatfluelarver.

ATFERD OG HÅNDTERING

Theloderma asperum er nattaktiv og sitter om dagen skjult i rør, mellom planter eller tett på vannet. Den klarer seg godt i en gruppe så lenge det er plass nok, og den yngler fint i par, men en gruppe gir de beste resultatene.

NATURLIG UTBREDELSE

Malaysia, Thailand, Myanmar (Burma), India, Bangladesh, Bhutan, Vietnam, Kambodsja og Indonesia.