herpy

FROSKER

Chapa Bug-eyed Frog

Theloderma bicolor

Theloderma bicolor er en liten, mosegrønn frosk fra de fuktige fjellskogene i Nord-Vietnam og Sør-Kina. Den er flattrykt og dekket av knudrete vorter, så den nesten forsvinner mellom mose og lav. Arten er nattaktiv og trenger et kjølig, fuktig terrarium med en vanndel, fordi den ikke tåler varme. Pleien ligner på de øvrige mosefroskenes, men flere avlstall er lånt fra slektninger.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus leprosus bicolor; Rhacophorus bicolor*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Fjellskog og klippeterreng**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**50 × 30 × 40 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**16-20 °C**
Temperatur, natt	**13-18 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vann	**Vanndel** dybde 5-10 cm
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Kjønnsmoden	**8-10 mnd.**
Egg per legging	**3-25**
Klekking	**9-22 dager**
Larvetid	**75-180 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Pleien av *Theloderma bicolor* ligner på slektningene *Theloderma corticale* og *Theloderma asperum*, men arten må holdes kjøligere. Den trives bare i et terrarium der temperaturen kan holdes lav.
TEMPERATUR	Arten er en fjellfrosk og tåler ikke varme. På dagen skal det være 16-20 °C og om natten 13-18 °C, som passer til klimaet i høylandet. Kortvarig tåler den ned til rundt 10 °C.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være 80-90 %, og aldri under 60 %.
VANN OG VANNKVALITET	Vanndelen er en fast del av terrariet. Gi 5-10 cm vann med korkplater og korkrør som land og skjul.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv, så lyset er først og fremst til plantene. Et lysstoffrør på 6.500 K i 12 timer om dagen er nok til planter som pothos og fredslilje.
FÔRING	*Theloderma bicolor* spiser levende insekter. Bruk sirisser som basis, supplert med voksmøllarver, dubia-kakerlakker, fluer og soldatfluelarver. Fôrdyrene må høyst være like lange som avstanden mellom froskens øyne.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Theloderma bicolor* sitter skjult mellom planter og i kork på dagen og kommer frem når det blir mørkt. Dyrene kan holdes i par eller i en liten gruppe på tre til fire når terrariet har nok plass og skjul.
NATURLIG UTBREDELSE	Vietnam og Kina.