herpy

FROSKER

Tonkin Bug-eyed Frog

Theloderma corticale

Theloderma corticale er en nattaktiv, halvt vannlevende frosk fra skogene i Nord-Vietnam, Laos og Sør-Kina. Den knudrede, grønn- og svartflekkede huden ligner mose og lav så godt at frosken nesten forsvinner i terrariet. Den vil ha det kjølig og vått og tåler ikke varme, men er til gjengjeld lett å få til å yngle.

Familie: Rhacophoridae Tidligere navn: *Rhacophorus corticalis*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-9 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog, fjellskog og klippeterreng**
Hudgift	**Ingen kjent**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**80 × 50 × 40 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-23 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vann	**Akvaterrarium** dybde 5-10 cm
Vanntemperatur	**17-22 °C**
UVB	**Valgfritt** Ferguson-sone 1
Vinterhvile	**13-16 °C** 4-22 uker
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**På blader over vann**
Kjønnsmoden	**8-10 mnd.**
Egg per legging	**6-47**
Klekking	**9-22 dager**
Larvetid	**75-180 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	*Theloderma corticale* må ha et akvaterrarium der en stor del av bunnen, eller hele bunnen, står under vann.
TEMPERATUR	Varme er artens største fiende. Om dagen skal det være 18-23 °C og om natten 15-20 °C. Ned til omtrent 10 °C går fint, mens alt over 25 °C er et faresignal, og temperaturer over 27 °C kan drepe froskene.
LUFTFUKTIGHET OG DUSJING	Luftfuktigheten skal være høy: over 80 % og aldri under 60 %, ellers kan froskene tørke ut. Hunnene legger egg ved 80-90 %. Den store vannflaten holder fuktigheten oppe av seg selv, så froskene trenger ikke duskes så ofte.
VANN OG VANNKVALITET	Vanndelen er artens hjem. Vannet skal være 5-10 cm dypt, og dypere vann fungerer også. Froskene må kunne sitte i vannet og enkelt komme opp på kork eller røtter.
LYS OG UVB	Frosken er nattaktiv og har ikke dokumentert behov for UVB. Et svakt UVB-rør for skyggearter (Ferguson-sone 1) kan brukes og gir den lille UV-indeksen som kan støtte døgnrytmen, men det er valgfritt.
FÔRING	*T. corticale* spiser insekter: velfôrede sirisser, dubiakakerlakker, voksmøllarver, soldatfluelarver og små hornorm.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Theloderma corticale* er rolig og skjuler seg om dagen i rør, huler og mellom planter. Noen få minutter etter at lyset er slukket, blir den aktiv.
NATURLIG UTBREDELSE	Vietnam, Laos og Kina.