herpy

FROSKER

Milk Frog

Trachycephalus typhonius

Trachycephalus typhonius er en stor, nattaktiv trefrosk med knudret hud og gyldne øyekanter. Den lever over et enormt område fra Mellom-Amerika til det nordlige Argentina, fra regnskog til savanne og hager. Huden skiller ut et hvitt sekret som svir i slimhinner, og pleieerfaringene er få.

Familie: Hylidae Tidligere navn: *Phrynohyas venulosa* **Mild hudgift**

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne, tørrskog og regnskog**
Hudgift	**Mild** Vask hendene etter kontakt, og hold fingrene unna øyne og munn
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Utvikling	**Rumpetroll i vann**
Egglegging	**I vann**
Egg per legging	**100-1 500**
Klekking	**1-2 dager**
Larvetid	**21-75 dager** fra klekking til metamorfose
Larvefôr	**Alger/planter og ferdigfôr**
Yngelpleie	**Ingen**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller i gruppe**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET
Pleien av *Trachycephalus typhonius* bygger på den nært beslektede *Trachycephalus resinifictrix*, som er en tilsvarende stor, nattaktiv trefrosk.

TEMPERATUR
Hold terrariet på 24-28 °C om dagen og 18-22 °C om natten. Det er ingen vinterhvile. Frosken tåler et kortvarig avvik, men temperaturen må ikke ligge over 30 °C over lengre tid.

LUFTFUKTIGHET OG DUSJING
Luftfuktigheten skal ligge på 60-90 % med en økning etter sprøyting. Arten lever også i tørre biotoper og er hardfør, så luften trenger ikke å være mettet hele tiden.

VANN OG VANNKVALITET
Sett en stor, stabil vannskål i terrariet. Skålen må være så stor at frosken kan sitte i den, og vannet må være lavt, slik at dyret lett kommer opp igjen.

LYS OG UVB
Gi 10-12 timers lys om dagen, først og fremst til plantene. Frosken sover om dagen og er mest aktiv i mørket, så den trenger ikke sterkt lys. Et lavt nivå av UVB hjelper frosken med å ta opp kalken i fôret.

FÔRING
Frosken tar det meste den klarer å overkomme: sirisser, stuefluer, spyfluer, kakerlakker, ormer og andre insekter. Sirisser kan utgjøre hovedtyngden av kostholdet, og de andre fôrdyrene gis vekselvis.

ATFERD OG HÅNDTERING
Trachycephalus typhonius er nattaktiv og sover om dagen i skjul, ofte høyt oppe, mens den blir aktiv når lyset slukkes.

NATURLIG UTBREDELSE
Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad og Tobago, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasil, Bolivia, Paraguay og Argentina.