herpy

GEKKOER

Chondrodactylus turneri

Chondrodactylus turneri er en kraftig, nattaktiv gekko fra savanne og klippeland i det sørlige og østlige Afrika, med store oransje øyne, brune bånd og heftelameller under tærne. Den er enkel å holde, men sky og rask, så den passer best for den som vil se på dyret sitt og ikke ta det opp.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Turner's thick-toed gecko Tidligere navn: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**15-22 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Klippelevende**
Biotop	**Savanne og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**33-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**50-60 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Et par kan holdes i et terrarium på 60 × 40 × 40 cm (lengde × bredde × høyde) eller 80 × 40 × 40 cm. Selv 60 × 30 × 30 cm kan gå, men mer plass gir bedre mulighet til å lage både varme og kjølige soner.

TEMPERATUR

Hold 25-28 °C om dagen, og lag et varmt sted, for eksempel en stein under en spotlampe, der temperaturen kan nå opp mot 35 °C. Dyrene legger seg gjerne på den oppvarmede steinen når lyset slås av, og får varme derfra.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Chondrodactylus turneri lever på tørre klipper og i savanne, så luften skal holdes forholdsvis tørr, rundt 30-50 %, som hos slektningene *Chondrodactylus bibronii* og *Chondrodactylus angulifer*.

LYS OG UVB

Chondrodactylus turneri er nattaktiv og sover i sprekkene om dagen, så den trenger ikke kraftig lys. Bruk en tidsbryter til å slå lyset av og på, slik at det blir omtrent 12 timers dag og helt mørkt om natten.

FÔRING

Chondrodactylus turneri har god appetitt og er ikke kresen. Den spiser sirisker, kakerlakker, melormer, møll og gresshopper. Sirisker og kakerlakker er godt grunnfôr, mens møll og gresshopper om sommeren er en yndet godbit.

ATFERD OG HÅNDTERING

Chondrodactylus turneri er ikke et dyr til håndtering. Den kan være vill og uforutsigbar. En dag solbader den rolig på en stein, og en annen dag stikker den av i panikk så snart noen kommer i nærheten.

NATURLIG UTBREDELSE

Sør-Afrika, Zimbabwe, Mosambik, Botswana, Eswatini, Tanzania, Malawi og Zambia.