herpy

GEKKOER

Correlophus sarasinorum

Correlophus sarasinorum er en stor, sjelden og nattaktiv gekko fra de fuktige skogene helt i sør på Ny-Caledonia. Den ligner en kraftig utgave av slektningen *Correlophus ciliatus*, men har større øyne, ofte en lys V-tegning i nakken og en langt mer begrenset utbredelse. Arten er sårbar i naturen og sjelden i terrarier.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Sarasin's giant gecko Tidligere navn: *Rhacodactylus sarasinorum* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det er bare lite dokumentert praksis for *Correlophus sarasinorum*, så tallene bygger på erfaringene med den mindre *C. ciliatus*.
TEMPERATUR	Temperaturene er lånt fra *C. ciliatus* og er et forsiktig utgangspunkt, ikke målte verdier for *Correlophus sarasinorum*. Om dagen er 22-26 °C passende, og et lite område øverst kan gjerne nå 26-28 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten hos *Correlophus sarasinorum* bør svinge som i skogen, der nettene er fuktige og dagene tørker opp.
LYS OG UVB	*Correlophus sarasinorum* er aktiv i skumringen og om natten og sover i trehull om dagen. Det er ikke dokumentert hvor mye UVB den trenger.
FÔRING	Det finnes ingen publisert fôringspraksis for *Correlophus sarasinorum*. Den er altetende og spiser insekter og frukt i naturen.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Correlophus sarasinorum* er nattaktiv og lever skjult. Om dagen gjemmer den seg, og den blir først for alvor aktiv når lyset slås av.
NATURLIG UTBREDELSE	Ny-Caledonia.