herpy

GEKKOER

South-western clawless gecko

Crenadactylus ocellatus

En av Australias aller minste gekkoer: høyst 4 cm fra snute til kloakk og helt uten klør på tærne. *Crenadactylus ocellatus* lever skjult under bark, nedfalt tre og stein i det sørvestlige Australia. Det finnes bare lite kunnskap om stellet, og arten er nesten ukjent i terrarier utenfor Australia.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus ocellatus; Diplodactylus bilineatus*

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**3-4 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og temperert skog og eng**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**30 × 20 × 20 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**55-75 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Crenadactylus ocellatus*, og arten holdes nesten ikke utenfor Australia.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 22-26 °C i terrariet, og et lite område i den ene enden kan gjerne nå 28-30 °C. Om natten kan temperaturen falle til 14-18 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal være lav til middels: 30-50 %. Terrariet skal være overveiende tørt, men det fuktige skjulet holdes lett fuktig med sphagnum eller jord, slik at dyrene kan søke fuktighet og hudskiftet forløper lett.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og lever skjult om dagen, så UVB er ikke nødvendig. Et svakt UVB-lys for skyggedyr (Ferguson-sone 1) kan monteres over den ene halvdelen av terrariet, men det skal alltid være store skyggefulle områder og skjul.
FÔRING	Kosten i naturen er ikke dokumentert. Til størrelsen passer små leddyr: spretthaler, bananfluer, små termitter, nyklekte sirisser og små kakerlakker. Byttet må ikke være større enn avstanden mellom øynene til dyret.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Crenadactylus ocellatus* er rask, sjenert og vanskelig å se, fordi den skjuler seg om dagen og er aktiv i mørket.
NATURLIG UTBREDELSE	Australia.