herpy

GEKKOER

Cyrtodactylus peguensis

En nattaktiv gekko fra Myanmar, Thailand og Vest-Malaysia, kjent fra skogene ved Pegu. Det finnes bare få pålitelige stellopplysninger om arten, så veiledningen bygger på erfaringer med andre arter i slekten og er et forsiktig utgangspunkt.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Pegu bent-toed gecko Tidligere navn: *Gymnodactylus peguensis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**8-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-27 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**90-150 dager** ved 22-25 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Opplysningene her er lånt fra beslektede arter i slekten *Cyrtodactylus* og fra de generelle kravene til nattaktive, klatrende gekkoer fra fuktige områder, ikke fra *C. peguensis* selv.
TEMPERATUR	Det finnes ingen dokumenterte temperaturer for *Cyrtodactylus peguensis*.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Arten er sannsynligvis avhengig av høy luftfuktighet, men tallene er lånt fra slektninger. *C. irianjayaensis* holdes ved 70-100 % og *C. elok* ved 70-85 %.
LYS OG UVB	Det finnes ingen dokumentert kunnskap om hvor mye lys *Cyrtodactylus peguensis* krever. Arten er nattaktiv, og beslektede arter klarer seg med svak belysning.
FÔRING	Arten er insektspiser. Opplysningene om fôr er lånt fra slektninger og er ikke dokumentert for *Cyrtodactylus peguensis*. Gi sirisser, dubia-kakerlakker og lignende insekter som er mindre enn avstanden mellom dyrets øyne.
ATFERD OG HÅNDTERING	Slekten har rykte på seg for å være sky, rask og med tynn, sart hud som lett revner. Blir den grepet, kan den bite. Håndtering frarådes derfor, og et dyr skal alltid få tid til å falle til ro etter en flytting.
NATURLIG UTBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand og Malaysia.