herpy

GEKKOER

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri er en liten, slank gekko fra regnskogens lavland langs østkysten av Madagaskar, omtrent 6-8 cm inkludert hale. Den ble i mange år regnet som en del av *Ebenavia inunguis* og har først siden 2018 igjen vært en selvstendig art. Det finnes bare lite kunnskap om stellet.

Familie: Gekkonidae Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**60-90 dager** ved 24-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Ebenavia boettgeri*. Tallene i veiledningen er lånt fra *Ebenavia inunguis*, den nærmeste og best kjente slektningen, og de passer med klimaet i utbredelsesområdet.

TEMPERATUR

Om dagen skal terrariet holdes på 26-28 °C. Om natten faller temperaturen til omtrent 22 °C om sommeren og 18 °C om vinteren. Et lysstoffrør gir normalt nok varme.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge rundt 70 %. Det er lett å holde ved å sprøyte terrariet én gang om dagen, gjerne om kvelden, slik at blader og bark blir fuktige.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og skjuler seg om dagen. Terrariet belyses og varmes opp med et lysstoffrør, slått på 12 timer om dagen om sommeren og 10 timer om vinteren, styrt av en tidsbryter. UVB er valgfritt.

FÔRING

Gi små insekter og andre små leddyr som er mindre enn dyrets hode: bananfluer, spretthaler, nyklekte og små sirisser og små skrukketroll. Tilby fôr annenhver til hver tredje dag, og juster etter hvor fyldig kroppen og halerota er.

ATFERD OG HÅNDTERING

Ebenavia boettgeri er langsom og luskende og ikke egnet til håndtering. Dyr man prøver å ta opp, kan flykte og kaste halen, og den vokser ikke ut igjen i samme form. Arten er et dyr man ser på i terrariet, særlig i skumringen.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.