herpy

GEKKOER

Eublepharis fuscus

En kraftig, bakkelevende gekko fra det vestlige India med mørke flekkbånd over ryggen, fløyelsaktig hud og bevegelige øyelokk. Den er nattaktiv, spiser insekter og må ha høyere luftfuktighet enn den nære slektningen *Eublepharis macularius*. Det finnes bare få beskrevne stellerfaringer for akkurat denne arten, så mye av veiledningen bygger på slektningen.

Familie: Eublepharidae Engelsk: Western Indian leopard gecko Tidligere navn: *Eublepharis macularius fuscus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Klippelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Varmeplass	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**16-21 °C**
Luftfuktighet	**60-75 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-10 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Kull per år	**6-8**
Inkubasjon	**35-89 dager** ved 27-32 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Terrariemålene er lånt fra *Eublepharis macularius*. Et voksent dyr må ha et terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og bunnarealet er viktigere enn høyden, fordi arten lever på bakken.

TEMPERATUR

Det er ikke målt temperaturer for arten i naturen, og bare få angivelser for fangenskap.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Eublepharis fuscus må ha mye høyere luftfuktighet enn *E. macularius*. Hold den over 60 %, med topper opp til 85 % om natten, og om sommeren omtrent 75 %. Om vinteren kan fuktigheten falle litt.

LYS OG UVB

Arten er aktiv i skumringen og om natten, men lys om dagen regulerer døgnrytmen og stimulerer appetitten. Gi omtrent 14 timer lys om sommeren og skru gradvis ned til omtrent 8 timer om vinteren, helst styrt av en tidsbryter.

FÔRING

Dyret spiser bare insekter, og dette avsnittet er lånt fra *Eublepharis macularius*. Gi sirisser, mel- og kjempemelormer, dubia-kakerlakker, silkeormer og larver av svart soldatflue om hverandre.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er sky om dagen og aktiv i skumringen og om natten. La nye dyr falle til i to uker før de håndteres, og venn dem deretter til hånden med korte økter på omtrent 5 minutter.

NATURLIG UTBREDELSE

India.