herpy

GEKKOER

Western chameleon gecko

Eurydactylodes occidentalis

Eurydactylodes occidentalis er den minste arten i slekten av nykaledonske kameleongekkoer: en liten, nattaktiv tregekko med gripehale som bare lever i kystlavlandet på vestsiden av Grande Terre. Arten ble først beskrevet i 2009, er truet i naturen og sees bare sjelden i fangenskap. Stellet bygger på slektningene *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*.

Familie: Diplodactylidae

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**5 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**50-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Eurydactylodes occidentalis*. Tallene er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, som har nesten samme levevis og størrelse.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 22-26 °C i det meste av terrariet og et varmt punkt under en lampe på 27-29 °C. Om natten skal temperaturen falle til 20-23 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Hold luftfuktigheten på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den er lavest i den varme enden og høyest i den kjølige. Den skal stige om natten og falle i løpet av dagen, men aldri komme under 50 %.
LYS OG UVB	Arten er nattaktiv og klarer seg uten UVB når fôret inneholder D3-vitamin, men et svakt UVB-lys er en fordel.
FÔRING	Arten er sannsynligvis frukt- og insektetere som resten av slekten. Gi omtrent halvparten ferdigfôr til fruktetende gekkoer, rørt ut til en tykk grøt, og halvparten levende insekter.
ATFERD OG HÅNDTERING	*Eurydactylodes occidentalis* er liten og rolig, og slektens arter kan venne seg til kort håndtering. La et nytt dyr få to uker i fred, og håndter det bare hvis det har spist.
NATURLIG UTBREDELSE	Ny-Caledonia.