herpy

GEKKOER

Eurydactylodes symmetricus

Eurydactylodes symmetricus er en liten, nattaktiv og sjelden gekko fra kratt og skog i det sørlige Ny-Caledonia, med store, symmetrisk ordnede hodeskjell og en gripehale. Den er langt mindre kjent enn slektningene *Eurydactylodes agricolae* og *Eurydactylodes vieillardi*, men stellet er trolig nesten likt.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Symmetrical gecko Tidligere navn: *Eurydactylus symmetricus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Varmeplass	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**50-90 dager** ved 22-26 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Nær truet (NT)**

Om arten

Eurydactylodes symmetricus er en liten, slank gekko med trekantet hode, store øyne uten lokk og loddrette pupiller. Hodeskjellene er store, plateformede og ordnet symmetrisk uten små korn imellom, og i nakken sitter et kors av hevede knotter. Kroppens skjell er ellers ganske jevne uten spesielt store, flate skjell, og det skiller arten fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*. Fra munnviken løper en gul fure bakover forbi øreåpningen. Kroppen er typisk lys med mørkere marmorering som noen ganger danner tverrbånd, og buken er hvit.

Kroppen (snute til kloakk) måler opptil omtrent 6 cm, og den gripende halen er 100-107 % av kroppslengden, slik at den samlede lengden ligger omkring 10-13 cm. Vekten er ikke dokumentert.

Arten ble beskrevet av den svenske zoologen Lars Gabriel Andersson i 1908 som *Eurydactylus symmetricus*. Den er sjelden i naturen. Slekten har fire arter.

Levetiden er ikke dokumentert. *E. vieillardi* og *E. agricolae* kan leve minst 10 år.

Utbredelse og leveområde

Eurydactylodes symmetricus lever bare i den sørlige delen av hovedøya Grande Terre i Ny-Caledonia. Utbredelsen strekker seg fra Pic Ningua i nord til Prony i sør og omfatter blant annet Rivière Bleue og Goro-platået i det sørlige fjellandet.

> **Naturlig utbredelse:** Ny-Caledonia.

LEVEOMRÅDE

Arten lever i maquis, et tett kratt på de næringsfattige ultramafiske jordene i det sørlige Ny-Caledonia, og i lukket, fuktig skog, fra omtrent 20 til 1050 meters høyde. Den er nattaktiv og lever i busker og trær. Klimaet er subtropisk med en varm, fuktig tid og en kjøligere, tørrere tid av året.

Arten er nær truet (NT). I skogene går den tilbake der den invasive maurarten *Wasmannia auropunctata* er tallrik, og krattet forringes av gjentatte branner og gruvedrift.

Stell

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stellet av *Eurydactylodes symmetricus*. Tallene her er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*, som har samme størrelse og levesett. Til ett voksent dyr skal terrariet være minst 45 × 45 × 60 cm (lengde × bredde × høyde). Større er alltid bedre, og høyden er viktigere enn bunnarealet, fordi arten klatrer. Et par eller en hann med to hunner kan holdes sammen; uten avl er det ingen grunn til mer enn ett dyr. Et glassterrarium med nett i lokket passer godt.

Innred med mange tynne greiner i ulike tykkelser, lianer, kork og blader, slik at dyret kan klatre og sove i løvet. Det må være skjul i alle høyder. Levende planter hjelper med å holde på fuktigheten. Som bunn fungerer 60 % økologisk matjord og 40 % kokosfiber med et tykt lag blader oppå. Fjern ekskrementer daglig, og skift hele bunnen hver tredje til fjerde måned.

TEMPERATUR

Gi en varm plass under en lampe på 27-29 °C og en kjølig sone på 21-24 °C. Om dagen ligger temperaturen i det meste av terrariet på 22-26 °C, og om natten faller den til 20-23 °C. En svak varmepære på omtrent 40 W over en gren øverst i terrariet er den enkleste oppvarmingen. Varmen er høyest oppe, så det må være greiner og løv i alle høyder. Over 30 °C er for varmt.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold luftfuktigheten på 60-80 %, målt midt i terrariet. Den skal stige om natten og falle i løpet av dagen, men aldri komme under 50 %. Sprøyt terrariet grundig hver kveld og om morgenen etter behov, slik at dyret kan drikke dråper fra bladene. Sett dessuten fram en skål med friskt vann, og la bunn og greiner tørke opp mellom sprøytingene.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og kan klare seg uten UVB når fôret inneholder D3-vitamin, men svakt UVB-lys er en fordel. Et UVB-rør til skyggedyr (Ferguson-sone 1), for eksempel et T5-rør på 7 %, plasseres 20-30 cm over nettet eller 25-40 cm under nettet. Målet er en UV-indeks på 1-2 på den øverste greinen. Det må alltid være skygge i resten av terrariet. Hold lyset tent 10-12 timer om vinteren og litt lenger om sommeren.

Les mer: Lys og UVB Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

FÔRING

Arten er trolig frukt- og insektetende som slektens øvrige arter. Gi omtrent halvparten ferdigfôr til fruktetende gekkoer, rørt opp til en tykk grøt i en skål på en veggmontert hylle, og halvparten levende insekter. Unger opptil ett år får insekter annenhver dag og grøt 2-3 ganger i uken; voksne får insekter og grøt 2-3 ganger i uken. Egnede insekter er sirisser, kakerlakker, gresshopper, silkeormer og voksmøll, ikke lengre enn avstanden mellom dyrets øyne. Pudre insektene med kalk og D3-vitamin, og gi et multivitamin én gang i måneden.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl

ATFERD OG HÅNDTERING

Slektens arter er små, forholdsvis rolige og kan vennes til håndtering. La et nytt dyr få to uker i fred, og håndter det bare hvis det har spist. Hold øktene under fem minutter, støtt føtter, kropp og hale, og ta aldri tak i halen. Håndter helst om kvelden.

E. vieillardi og *E. agricolae* kan sprøyte en klebrig, illeluktende væske fra halen når de blir skremt, og den gir smertefull irritasjon hvis den treffer øynene. Om *E. symmetricus* kan det samme, er ikke dokumentert, men håndter dyret på samme måte, og vask hendene etterpå.

Et par eller en hann med to hunner kan gå sammen, men to hanner må ikke holdes sammen.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Alder og vekt ved kjønnsmodning er ikke dokumentert for *Eurydactylodes symmetricus*. Hannene har en tydelig hemipenisbule og voksaktige, ofte gule porer foran kloakken. Dyrene bør være fullt utvokste og i god hold før de settes i avl.

PARRING

Hos *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae* stimulerer en hvileperiode på to til tre måneder med 20-22 °C om dagen og under 12 timers lys eggleggingen, hvoretter lys og temperatur heves igjen. Par og små grupper med én hann og to hunner kan gå sammen hele året. Det er ikke dokumentert for *E. symmetricus*.

EGGLEGGING OG KULL

Arten er eggleggende. Kullstørrelsen er ikke dokumentert; slektens øvrige arter legger ett til to egg om gangen med tre til fire ukers mellomrom. Gi hunnen en eggleggingskasse med minst 10 cm dybde, fylt med en fuktig blanding av torv og vermikulitt, slik at hun kan grave. Følg med på egg utenfor kassen. Gi henne rikelig med kalk og insekter gjennom hele sesongen.

INKUBASJON

Inkubasjonen er ikke beskrevet for *Eurydactylodes symmetricus*; tallene er lånt fra *Eurydactylodes vieillardi* og *Eurydactylodes agricolae*. Flytt eggene forsiktig, uten å vende dem, til en boks med fuktig vermikulitt, og åpne lokket hver fjerde til sjuende dag, slik at lufta skiftes. Ved 22-26 °C klekkes eggene etter 50-90 dager; angivelsene svinger fra omtrent 50 dager til 70-90 dager ved 23-24 °C.

OPPDRETT AV UNGER

Oppdrett av unger er ikke beskrevet for *Eurydactylodes symmetricus*. Hos slektens øvrige arter får ungene samme stell som de voksne, med kraftig daglig sprøyting, slik at de kan drikke dråper, og god ventilasjon. Mangel på vann er den hyppigste årsaken til at ungene ikke trives, men for fuktig og uten luft gir luftveisinfeksjoner.

Helse og vanlige feil

Det finnes ikke helsedata for *Eurydactylodes symmetricus*. Typiske problemer hos slekten skyldes stellet:

- Vedvarende for høy eller for lav fuktighet, som gir hud- og luftveisproblemer. Hold fuktigheten på 60-80 %, og la terrariet tørke opp i løpet av dagen.
- For mye varme. Hold temperaturen under 30 °C.
- Mangel på kalk og D3-vitamin, særlig hos hunner i avl.
- Tap av halen. Ta aldri tak i halen.

Søk veterinær med erfaring med reptiler hvis dyret går ned i vekt, ikke spiser på flere uker eller virker slapt.

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.