herpy

GEKKOER

Gonatodes albogularis

En liten, dagaktiv gekko fra Mellom-Amerika, Colombia, Venezuela og de store karibiske øyene. Hannen har gult til oransjegult hode og mørk kropp, mens hunnen er brunflekket. Arten har ingen heftelameller, men klatrer og jakter i dagslys og passer godt i et tett beplantet, høyt terrarium.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Yellow-headed gecko Tidligere navn: *Gymnodactylus albogularis* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-10 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Varmeplass	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**10-12 mnd.**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**60-100 dager** ved 26-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Arten trives i et loddrett terrarium. En enkelt voksen gekko kan holdes i omtrent 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og et par må ha minst 40 × 30 × 45 cm. Større er bedre, fordi aktive dyr bruker hele rommet.

TEMPERATUR

Gonatodes albogularis må ha 24-28 °C om dagen. Et lite varmere område på 28-30 °C er greit, men arten soler seg nesten ikke, og det må alltid være kjøligere, skyggefulle steder å trekke seg inn i.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten skal ligge på 60-80 %, og det må være god ventilasjon. Sprøyt terrariet én gang om dagen, slik at det sitter dråper på blader, kork og ruter som gekkoene kan drikke av.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og må ha lys 11-13 timer i døgnet. Dagslysrør av typen T5 gir både lys og litt varme og er nok i seg selv.

FÔRING

Arten lever av små insekter og andre byttedyr som er mindre enn avstanden mellom dyrets øyne. Voksne dyr kan få små sirisser, vingeløse bananfluer, små kakerlakker, stuefluer, møll, ildkre og små melormer.

ATFERD OG HÅNDTERING

Arten er mer sky enn daggekkoer av slekten *Phelsuma*, men ses ofte, særlig ved fôring. Den skal ikke håndteres. Den er liten og rask, og ett enkelt hopp eller et fall kan gi en skade eller en flukt.

NATURLIG UTBREDELSE

Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Cuba, Haiti, Jamaica og Caymanøyene.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/gonatodes-albogularis