herpy

GEKKOER

Gonatodes vittatus

En liten, dagaktiv gekko fra Venezuela, Colombia og øyene utenfor kysten, der hannen har en hvit stripe med svart kant nedover ryggen og et gult hode. Den klatrer på trestammer og murer, men kan ikke gå opp langs glass, og den klarer seg fint i et lite terrarium hvis den holdes alene eller som par.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Wiegmann's striped gecko Tidligere navn: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-20 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Varmeplass	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**65-110 dager** ved 25-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par kan holdes i et terrarium på 30 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde). Det er et minimum, og et større terrarium er bedre, særlig hvis flere dyr deler det.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 24-27 °C i terrariet. Et varmt sted på 29-32 °C kan lages med en varmematte eller en lampe, men det er ikke nødvendig hvis temperaturen ellers er høy og stabil.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	*Gonatodes vittatus* trives i tørrere luft enn de fleste tropiske gekkoer. Hold luftfuktigheten på 50-60 %.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv, men om den trenger UVB, er omdiskutert. UV-lys mistenkes for å gi problemer med hudskiftet, men dyr under UV-lys ser til gjengjeld ut til å yngle lettere.
FÔRING	*Gonatodes vittatus* spiser insekter og andre små leddyr. Unger kan ta dyr som tilsvarer nålehoder: nyklekte sirisser (opptil omtrent 3 mm), bananfluer (*Drosophila melanogaster*), spretthaler og små hvite skrukketroll.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er dristig og nysgjerrig og ses ofte om dagen, men den er ikke et dyr som skal håndteres. Huden kan rives i stykker hvis dyret grepes, og dyrene stresses lett. Nyt den heller fra den andre siden av glasset.
NATURLIG UTBREDELSE	Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad og Tobago, Aruba og Curaçao.