herpy

GEKKOER

Hemidactylus frenatus

Hemidactylus frenatus er en robust, nattaktiv gekko fra Sør- og Sørøst-Asia, som har fulgt med skip og last ut i hele tropene og i dag bor i husene i store deler av verden. Den klatrer på loddrette flater, jakter på insekter under lamper og kaller med et høyt, tikkende klukking. I terrarier er den sjelden, og den er best kjent som en invasiv art.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Common house gecko Tidligere navn: *Hemidactylus vittatus; Hemidactylus okinawensis* Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-15 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**I skumringen og om natten**
Levevis	**Trelevende og klippelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**22-25 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**6-12 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**46-62 dager** ved 28-30 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Ikke vurdert (NE)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Hemidactylus frenatus er sjelden beskrevet i fangenskap, så anbefalingene her er en vurdering ut fra levemåten og fra andre små, klatrende gekkoer.

TEMPERATUR

Det finnes ingen gode, offentlig tilgjengelige temperaturtall fra fangenskap, så tallene her bygger på levemåten til arten og på at den selv regulerer kroppstemperaturen ved 26-35 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold en luftfuktighet på omtrent 50-70 %, og spray terrariet lett en gang om dagen, helst om kvelden, så det er dugg på blader og steiner. Fuktigheten må kunne falle i løpet av dagen.

LYS OG UVB

Hemidactylus frenatus er aktiv i skumringen og om natten, og det finnes ingen dokumentert UVB-anbefaling.

FÔRING

I naturen er *Hemidactylus frenatus* en allsidig jeger. Insekter og edderkopper utgjør mesteparten av kosten: kakerlakker, termitter, fluer, møll, biller, bier og veps.

ATFERD OG HÅNDTERING

Hemidactylus frenatus er rask, nervøs og skal ikke håndteres. Den kan bite hvis den er stresset, men bittet er ganske svakt og harmløst for mennesker.

NATURLIG UTBREDELSE

India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar (Burma), Thailand, Kambodsja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia og Filippinene.