herpy

GEKKOER

Holodactylus africanus

En liten, nattaktiv bakkegekko fra de tørre områdene i Øst-Afrika med store øyne og bevegelige øyelokk, lange klør på tærne og en tykk, kort hale der den lagrer fett. Den graver sine egne skjul og lever særlig av termitter. Arten er sjelden i terrarier, og det finnes bare få beskrevne erfaringer med stell.

Familie: Eublepharidae Engelsk: African whole-toed gecko Tidligere navn: *Holodactylus aculeatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**6-11 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**10-15 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Bakkelevende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-30 °C**
Varmeplass	**33-35 °C**
Temperatur, natt	**18-20 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 1
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**45-60 dager** ved 26-28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare få oppgaver om terrariestørrelse for arten. Til ett dyr nevnes et terrarium på omkring 45 × 45 cm i grunnflate, og til en liten avlsgruppe med en hann og to hunner minst 90 cm i lengde.

TEMPERATUR

Om dagen skal det være 27-30 °C i terrariet med et varmt sted på omkring 33-35 °C under en lav varmelampe i den ene enden. I den andre enden skal det være kjøligere, slik at dyret selv kan velge.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten i selve terrariet skal være lav, omkring 30-40 % om dagen, slik at bunnen er tørr i overflaten. Fuktigheten kommer i stedet fra det fuktige skjulet, der dyret kan hvile og skifte hud.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og skjuler seg mesteparten av dagen. En fast døgnrytme med omkring 12-14 timer lys om sommeren og 10-12 timer om vinteren er en god ramme. Tallene er lånt fra beslektede arter.

FÔRING

I naturen lever *Holodactylus africanus* hovedsakelig av termitter, supplert med biller, edderkopper og andre små leddyr.

ATFERD OG HÅNDTERING

Det er en rolig, men bitesk art som helst vil være i fred. Bittet kan være kraftig, og dyret kan holde fast. Det er ikke farlig, men det gjør vondt, og såret må vaskes.

NATURLIG UTBREDELSE

Etiopia, Kenya, Somalia og Tanzania.