herpy

GEKKOER

Lygodactylus capensis

Lygodactylus capensis er en liten, gråbrun dvergegekko fra det sørlige og østlige Afrika, der den lever på trær i savanne og åpen skog og ofte på husvegger. Den er dagaktiv, blir 7-9 cm inklusive hale og veier under 1 g. Arten er slektens typeart og vanlig i naturen, men holdes sjelden.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Common dwarf gecko Tidligere navn: *Hemidactylus capensis; Lygodactylus strigatus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total lengde inkl. hale
Vekt	**0,7-1,1 g**
Levealder	**4-6 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Savanne**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 40 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Varmeplass	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-75 %**
Vann	**Ingen vannskål**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 2
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-15 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**60-120 dager** ved 24-27 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes bare lite kunnskap om stell av *Lygodactylus capensis*. Klimaet i utbredelsesområdet er varmt med regn om sommeren og en tørr, kjøligere vinter, og arten lever på trær i savanne og åpen skog.

TEMPERATUR

Om dagen skal bakgrunnstemperaturen ligge på 25-30 °C med en solflekk på 30-35 °C under en liten spot. Varmelampen trenger ikke å være på hele dagen: to til fire perioder på 30-45 minutter om sommeren og to om vinteren er nok.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luftfuktigheten holdes på 50-60 % om dagen og 60-75 % om natten. Sprøyt lett hver morgen, slik at blader og vegger får dråper, og la terrariet tørke opp i løpet av dagen.

LYS OG UVB

Lygodactylus capensis sitter ofte i full sol og trenger kraftig, jevnt lys. Bruk T5-lysrør eller LED med dagslys, og kombiner med et UVB-rør. UVB-styrken er ikke dokumentert for arten.

FÔRING

Maur utgjør 30-50 % av næringen i naturen. I terrariet består kosten av små levende fôrdyr: små sirisser, bananfluer, spretthaler, bønnebiller, små gråsugger og små kakerlakker.

ATFERD OG HÅNDTERING

Lygodactylus capensis er rask og kan lett slippe unna eller bli skadet, og halen kastes lett, så arten egner seg ikke til håndtering. Åpne bare lukene kortvarig, og følg med på spalter der dyrene kan slippe ut.

NATURLIG UTBREDELSE

Sør-Afrika, Eswatini, Mosambik, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Malawi, Kongo, Tanzania og Kenya.