herpy

GEKKOER

Paroedura bastardi

Paroedura bastardi er en middelsstor, bakkelevende og nattaktiv gekko fra det sørøstlige Madagaskar med kraftige lemmer, et bredt, trekantet hode og tornete knopper på halen. Den kan klatre på trestammer, men biter lett når den blir tatt opp, så den passer best for deg som vil se mer enn håndtere.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Mocquard's Madagascar ground gecko Tidligere navn: *Phyllodactylus bastardi* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**6-10 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende og bakkelevende**
Biotop	**Halvørken og tørrskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**9-10 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**51-65 dager** ved 29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det er bare få erfaringer med *Paroedura bastardi*, så målene bygger på *Paroedura picta*. Et enkelt voksent dyr eller en hann med et par hunner kan holdes i et terrarium på minst 50 × 30 × 30 cm (lengde × bredde × høyde).

TEMPERATUR

Tallene bygger på *Paroedura picta*. Om dagen skal det være 25-28 °C i terrariet, og et varmt område kan nå 29-31 °C. Om natten kan temperaturen falle til 21-23 °C. Slukk lyset om natten, slik at døgnrytmen bevares.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Hold luftfuktigheten på omtrent 60-70 %. Spray sidene av terrariet lett en gang om dagen, slik at det er dråper å drikke av og fuktigheten stiger. Et hygrometer viser om det holder.

LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og tilbringer det meste av dagen skjult. UVB er valgfritt, så lenge fôret tilsettes kalk og D3-vitamin. Det er ikke undersøkt om arten har nytte av UVB, og for *Paroedura picta* regnes UVB ikke som nødvendig.

FÔRING

Arten spiser insekter. Grunnfôret er sirisser, supplert med melorm og i mindre mengde voksmøllarver, som er feite og bare hører til som godbit.

ATFERD OG HÅNDTERING

Paroedura bastardi og de nære slektningene i artskomplekset biter raskt når de blir tatt opp, formentlig som forsvar.

NATURLIG UTBREDELSE

Madagaskar.