herpy

GEKKOER

Phelsuma klemmeri

En liten, lysende daggekko med turkis rygg og gult hode som lever i bambusskog på en liten flekk av nordvestlige Madagaskar. Den er truet i naturen, men godt etablert i terrarier og forholdsvis lett å avle, og den er et praktfullt dyr å iaktta framfor å håndtere.

Familie: Gekkonidae Engelsk: Yellow-headed day gecko Publisert 14. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**8-15 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H for 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Varmeplass	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Anbefalt** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter, frukt, nektar og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kjønnsmoden	**6-8 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 egg**
Inkubasjon	**40-60 dager** ved 27-29 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Liste II**
EU-vedlegg	**Vedlegg B**
IUCN	**Sterkt truet (EN)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Et par kan bo i et høyt terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (lengde × bredde × høyde), og en hann med to-tre hunner må ha minst 45 × 45 × 60 cm.
TEMPERATUR	Om dagen skal det være 25-28 °C i terrariet og en liten solplass på 30-32 °C under en halogenspot, der gekkoen kan varme seg opp.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten skal i gjennomsnitt ligge på 60-80 %, målt midt i terrariet. Sprut grundig om morgenen og igjen sent på ettermiddagen, slik at blader og ruter er dekket av dråper.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og må ha UVB. Bruk et T5-rør i en styrke og avstand som gir en UV-indeks på 3-4 ved de øverste sitteplassene (Ferguson-sone 3), og mål gjerne med et UV-indeksmeter.
FÔRING	Gekkoen spiser både små insekter og søte ting. Gi små levende insekter som bananfluer, nyklekte sirisser og små stuefluer, strødd med kalk med D3. Insektene skal være mindre enn avstanden mellom dyrets øyne.
ATFERD OG HÅNDTERING	Gekkoen er sky og rask og egner seg dårlig til håndtering. Er det nødvendig å flytte den, så lokk den inn i en beholder i stedet for å gripe den, for halen kastes lett, og huden er tynn og sart.
NATURLIG UTBREDELSE	Madagaskar.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/phelsuma-klemmeri