herpy

GEKKOER

# *Phyllurus caudiannulatus*

*Phyllurus caudiannulatus* er en liten, nattaktiv bladhalegekko fra skogene rundt Bulburin i det sentrale østlige Queensland i Australia. Halen er smal og rund med lyse ringer. Arten har en svært liten utbredelse og er nær truet i naturen.

Familie: Carphodactylidae  Engelsk: Ringed thin-tail gecko  Publisert 16. november 2026

**FAKTABOKS**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **10-11 cm**<br>snute-kloakk-lengde |
| Levealder | **5-10 år** |
| Aktiv | **Om natten** |
| Levevis | **Trelevende** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Vanskelighetsgrad | **Erfaren** |

### STELL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H for 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **20-25 °C** |
| Temperatur, natt | **15-19 °C** |
| Luftfuktighet | **55-100 %** |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Vinterhvile | **10-16 °C**<br>9-13 uker |
| Kosthold | **Insekter** |
| Holdes | **Alene eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Eggleggende** |
| Kjønnsmoden | **18-36 mnd.** |
| Kullstørrelse | **2 egg** |
| Kull per år | **2-4** |
| Inkubasjon | **90-110 dager**<br>ved 21-25 °C |

### VERN OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Liste II** |
| EU-vedlegg | **Vedlegg B** |
| IUCN | **Nær truet (NT)** |

## Om arten

*Phyllurus caudiannulatus* er en liten, slank, nattaktiv gekko som blir omtrent 10-11 cm fra snute til kloakk. Artsnavnet *caudiannulatus* betyr trolig "ringhalet" og henviser til de lyse båndene på halen. Slektsnavnet *Phyllurus* betyr "bladhale", men hos denne arten er halen smal og sylindrisk, ikke bred og flat som hos *Phyllurus platurus*. Den lever i trær, har klør på tærne og mangler hefteskjell, slik andre bladhalegekkoer har.

Arten ble beskrevet i 1975 og kan være en sammensatt art som dekker flere bestander. Den er vurdert som nær truet, og den holdes svært sjelden i terrarium.

## Utbredelse og leveområde

*Phyllurus caudiannulatus* lever bare i et lite område i det sentrale østlige Queensland i Australia: Bulburin-området i Dawes Range og Many Peaks Range sørvest for Miriam Vale. Typelokaliteten er Bulburin, omtrent 24 km sørvest for Miriam Vale. Funnene ligger samlet mellom omtrent 24,2 og 24,8 grader sør og 151,4 og 151,8 grader øst.

Den snevre utbredelsen er en del av grunnen til at arten er vurdert som nær truet.

**Naturlig utbredelse:** Australia.

### LEVEOMRÅDE

*Phyllurus caudiannulatus* er en nattaktiv trebeboer. Bulburin-området har den største resten av subtropisk regnskog i det sentrale Queensland, og her lever arten. Skogtype, høyde over havet og klima på artens egne levesteder er ikke nærmere beskrevet.

Arten legger egg og spiser insekter. Kullstørrelsen er to egg.

## Stell

### TERRARIET

Det finnes nesten ingen kunnskap om stell av *Phyllurus caudiannulatus*, så veiledningen bygger på de nære slektningene *Phyllurus platurus* og *Saltuarius salebrosus*. Målene er lånt fra *P. platurus*: et par holdes i et terrarium på minst 50 × 50 × 50 cm (lengde × bredde × høyde). Høyde og klatremuligheter er viktige.

Innred terrariet med loddrette stykker stiv bark og noen greiner, slik at dyret kan ta seg rundt. Arten sitter på bark, og gjemmesteder på bunnen er ikke nødvendige. Som bunnsubstrat kan fuktig kokosfiber eller en tynn blanding av fin sand og kokosmuld brukes. Terrariet må ha god ventilasjon med åpninger både øverst og nederst. Hunner som skal legge egg, må ha et dypt eggleggingssubstrat (se avl).

### TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 20-25 °C og natten 15-19 °C. Tallene er et forsiktig anslag ut fra *Phyllurus platurus* (22-26 °C om dagen) og *Saltuarius cornutus*, og de er ikke målt for *P. caudiannulatus*. Hold terrariet i den kjølige enden. Varme er den største risikoen for bladhalegekkoer, så plasser terrariet i skygge og sprøyt på varme dager.

En kjølig hvileperiode hører med til stellet (se avl).

### LUFTFUKTIGHET OG VANN

Sprøyt terrariet grundig om kvelden, slik at luftfuktigheten stiger mot 100 %, og la den falle til omtrent 55-60 % mellom sprøytingene. I hvileperioden sprøytes det hver kveld, slik at dyrene kan drikke dråpene. Bunnen må ikke være konstant våt. Tallene er lånt fra *Phyllurus platurus*.

### LYS OG UVB

Arten er nattaktiv og lever skjult om dagen, og UVB er ikke nødvendig. Gi terrariet en fast døgnrytme med svakt dagslys og mørke om natten. Ikke bruk sterke spotlamper og ikke farget nattlys, og sørg for skyggefulle partier hele dagen.

Les mer: Lys og UVB

### FÔRING

Arten spiser insekter, og vanlige fôrinsekter som sirisser og kakerlakker kan brukes. Fôrdyrene må høyst være på størrelse med dyrets hode. Gi to til tre insekter per dyr om gangen, og dryss dem jevnlig med kalk og multivitamin. Fjern rester neste morgen. Halen lagrer fett og viser hvordan dyret er i hold.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

### ATFERD OG HÅNDTERING

*Phyllurus caudiannulatus* er en skjult og nattaktiv art som sitter stille på bark om dagen. Den skal ikke håndteres mer enn høyst nødvendig, og aldri i halen, som den kaster av seg.

Hold den enkeltvis eller parvis med bare én hann per terrarium, slik som hos de nære slektningene.

## Avl

### KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Hannene har en tydelig hemipenisbule ved halerota, som hunnene mangler. Alderen er ikke dokumentert for *Phyllurus caudiannulatus*. Hos *Phyllurus platurus* settes dyrene først i avl når de er minst 18 måneder gamle, og hos *Saltuarius salebrosus* tar det 3-4 år.

### PARRING

Hos nære slektninger settes avlen i gang av en kjølig hvileperiode. Dyrene fôres ikke på en uke, og dagtemperaturen senkes deretter 2-3 grader om dagen til 10-16 °C. Hvileperioden varer to til tre måneder, og terrariet sprøytes hver kveld. Deretter økes temperaturen over en uke til normalen. Ta et dyr ut av perioden hvis det går ned mer enn noen få gram. Tallene er lånt fra *Phyllurus platurus*.

### EGGLEGGING OG KULL

Hunnen legger to egg om gangen. Hos beslektede arter legges to til fire kull per sesong med omtrent en måneds mellomrom. Hun må ha et 8-10 cm dypt, fuktig substrat av torvmose eller kokosfiber som klumper seg, men ikke er vått, og som aldri må tørke ut. Hun graver en rede, legger eggene og dekker dem til. Etter eggleggingen er hun tydelig tynnere.

### INKUBASJON

Fjern eggene fra reden, og ruge dem i en blanding av perlitt og vann i forholdet 1:1 etter vekt. Hos *Phyllurus platurus* ruges det ved 21-22 °C, og over 25 °C kan fostrene dø, så hold deg i den kjølige enden. Klekketiden er ikke dokumentert for *P. caudiannulatus*; hos slektninger er den 90-110 dager.

Temperaturens betydning for kjønnet er ikke avklart. Ungene skifter hud nesten umiddelbart etter klekkingen.

### OPPDRETT AV UNGER

Ungene holdes i en liten boks, for eksempel 30 × 20 × 20 cm, med tørkepapir som bunn og et stykke korkbark som gjemmested. Sprøyt annenhver dag, og tilby første fôr to til ti dager etter klekkingen. Gi små insekter, ikke større enn dyrets hode, dysset med kalk og multivitamin. Ungene spiser lite de første ukene og tar deretter godt til. Søsken som er klekket samtidig, kan som regel holdes sammen, men skill dem hvis den ene blir større eller dominerer.

## Helse og vanlige feil

Det finnes ingen dokumentert sykdomsoversikt for *Phyllurus caudiannulatus*, så listen bygger på de nære slektningene. De viktigste risikoene er:

- For høye temperaturer, særlig på varme sommerdager. Hold terrariet kjølig og i skygge.
- For tørr luft, som gir problemer med hudskiftet, der hudrester blir sittende fast på tær og halespiss.
- Konstant våt bunn og stillestående luft, som gir mugg og hudproblemer.
- Kalkmangel hvis fôret ikke dysses.
- Vekttap i hvileperioden. Ta dyret ut av perioden, og bygg det opp igjen.

Halen viser hvordan dyret er i hold. Søk veterinær med erfaring med krypdyr hvis dyret går ned i vekt, ikke spiser eller virker slapt.

### Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.