herpy

GEKKOER

Pristurus flavipunctatus

En liten, dagaktiv gekko fra landene rundt den sørlige delen av Rødehavet, med en høy, sagtakket hale og gule flekker. Den blir omtrent 8 cm lang inkludert hale, og det finnes nesten ingen kunnskap om stellet.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Rüppell's semaphore gecko Tidligere navn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende**
Biotop	**Halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**70-90 dager** ved 28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Stell i korte trekk

TERRARIET

Det finnes nesten ingen kunnskap om stellet av *Pristurus flavipunctatus*. Stellet bygger på klimaet i utbredelsesområdet og på *Pristurus carteri*, den best kjente arten i slekten i terrarier.

TEMPERATUR

Lag en gradient med 28-30 °C i den kjølige enden og en solplass på 40-45 °C under en spotlampe. Om natten kan temperaturen falle til omtrent 20-22 °C.

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luften skal være tørr, omtrent 30-40 %. Gi en veldig lav skål med friskt vann, eller legg steiner i skålen, slik at dyret ikke kan drukne, og sprøyt innredningen lett en gang i uken, slik at dyrene kan drikke dråper.

LYS OG UVB

P. flavipunctatus er dagaktiv og trenger kraftig dagslys og UVB over solplassen, for eksempel et T5-rør. Ferguson-sone 3 er et anslag for en dagaktiv ørkengekko; sonen er ikke målt for arten.

FÔRING

Arten spiser små leddyr. Gi spretthaler, bananfluer, små sirisser og andre små insekter, ikke bredere enn dyrets hode. Fôr voksne dyr annenhver eller hver tredje dag og unge dyr daglig, og fjern resten etter 15-20 minutter.

ATFERD OG HÅNDTERING

Pristurus flavipunctatus er rask og var og egner seg ikke til håndtering, og halen kan brekke av. Dyrenes atferd overfor hverandre i fangenskap er ikke dokumentert.

NATURLIG UTBREDELSE

Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Egypt og Saudi-Arabia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/pristurus-flavipunctatus