herpy

GEKKOER

Pristurus flavipunctatus

En liten, dagaktiv gekko fra landene rundt den sørlige delen av Rødehavet, med en høy, sagtakket hale og gule flekker. Den blir omtrent 8 cm lang inkludert hale, og det finnes nesten ingen kunnskap om stellet.

Familie: Sphaerodactylidae Engelsk: Rüppell's semaphore gecko Tidligere navn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti*
Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**5-8 år**
Aktiv	**Om dagen**
Levevis	**Klippelevende**
Biotop	**Halvørken og klippeterreng**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Varmeplass	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**30-40 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-sone 3
Kosthold	**Insekter og små leddyr (spretthaler, bananfluer)**
Holdes	**Alene eller parvis**

AVL

Formering	**Eggleggende**
Kullstørrelse	**1 egg**
Inkubasjon	**70-90 dager** ved 28 °C

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Om arten

Pristurus flavipunctatus er en liten gekko med slank kropp, lange, tynne ben og en hale som er lengre enn hode og kropp, kraftig sammentrykt fra sidene og med en sagtakket køl langs over- og undersiden. Hos hannene danner den øverste kølen en egentlig kam. Oversiden er lys gråbrun med mer eller mindre tydelige mørkere tverrbånd og en mørk stripe gjennom øyet. Ett målt dyr var 79 mm langt med hale; andre mål for totallengden er ikke funnet, så 7-8 cm i boksen er et anslag.

Arten ble beskrevet av Eduard Rüppell i 1835 fra kysten ved Massawa i Eritrea og er typeart for slekten *Pristurus*. Slektsnavnet kommer av gresk *pristos*, saget, og *oura*, hale, og artsnavnet av latin *flavus*, gul, etter de gule flekkene. Arten skilte seg fra artskomplekset rundt *Pristurus rupestris* for omtrent 21 millioner år siden. *P. percristatus* og *P. gasperetti* er i dag synonymer.

Slektens arter er dagaktive og signaliserer med halen og kroppsholdningen.

Utbredelse og leveområde

Pristurus flavipunctatus lever på begge sider av den sørlige delen av Rødehavet. På den afrikanske siden er den kjent fra Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia, Sudan, Sør-Sudan (Neberet-dalen) og Egypts Rødehavskyst, og på den arabiske siden fra det vestlige Saudi-Arabia, også Farasan-øyene. Typelokaliteten er Massawa i Eritrea. Opplysningene fra Jordan er usikre: dyr fra det sørlige Jordan ble tidligere ført til *P. flavipunctatus*, men regnes i dag til *Pristurus guweirensis*. De er ikke med på kartet.

Arten har et stort utbredelsesområde og vurderes ikke som truet.

> **Naturlig utbredelse:** Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Egypt og Saudi-Arabia.

LEVEOMRÅDE

Pristurus flavipunctatus lever i det varme, tørre lavlandet og de lave fjellene rundt Rødehavet og er funnet opp til minst 460 m over havet. Det faller bare lite regn, og dagtemperaturene er høye mesteparten av året. Leveområdet er bare sparsomt beskrevet; slektens arter lever på bakken, på stein og klipper eller i trær og busker, og dyrene holder seg tett på skjul. Temperatur og luftfuktighet i leveområdet er ikke målt for arten.

Les mer: Luftfuktighet, sprøyting og ventilasjon

Stell

TERRARIET

Det finnes nesten ingen kunnskap om stellet av *Pristurus flavipunctatus*. Stellet bygger på klimaet i utbredelsesområdet og på *Pristurus carteri*, den best kjente arten i slekten i terrarier. Tallene for temperatur, levetid og rugetid er lånt fra *P. carteri*.

Et voksent dyr kan holdes i et terrarium på 40 × 30 × 30 cm. Innred med flate steiner, skifer og røtter, slik at det oppstår sprekker og solplasser i flere høyder, og legg et bunnlag av fin sand blandet med jord. Steinene skal ligge stabilt og helst limes. Terrariet skal ha god ventilasjon og et tettsluttende lokk, for dyret er lite og raskt.

TEMPERATUR

Lag en gradient med 28-30 °C i den kjølige enden og en solplass på 40-45 °C under en spotlampe. Om natten kan temperaturen falle til omtrent 20-22 °C. Bruk termometre i begge ender og et infrarødt termometer til solplassen, og styr varmen med termostat. Søker dyret hele tiden skygge, er solplassen for varm.

Les mer: Varme og temperatur

LUFTFUKTIGHET OG VANN

Luften skal være tørr, omtrent 30-40 %. Gi en veldig lav skål med friskt vann, eller legg steiner i skålen, slik at dyret ikke kan drukne, og sprøyt innredningen lett en gang i uken, slik at dyrene kan drikke dråper. Fuktighetskravene er ikke undersøkt for arten.

LYS OG UVB

P. flavipunctatus er dagaktiv og trenger kraftig dagslys og UVB over solplassen, for eksempel et T5-rør. Ferguson-sone 3 er et anslag for en dagaktiv ørkengekko; sonen er ikke målt for arten. Ha lyset på 12 timer om dagen om sommeren og 9-10 timer om vinteren, og bytt UVB-røret etter produsentens anvisning.

Les mer: Lys og UVB

FÔRING

Arten spiser små leddyr. Gi spretthaler, bananfluer, små sirisser og andre små insekter, ikke bredere enn dyrets hode. Fôr voksne dyr annenhver eller hver tredje dag og unge dyr daglig, og fjern resten etter 15-20 minutter. Dryss fôret med kalk og vitaminer ved hver andre fôring. Næringen i naturen er ikke undersøkt.

Les mer: Fôrdyr: hold og avl Les mer: Kalk, vitaminer og tilskudd

ATFERD OG HÅNDTERING

Pristurus flavipunctatus er rask og var og egner seg ikke til håndtering, og halen kan brekke av. Dyrenes atferd overfor hverandre i fangenskap er ikke dokumentert. Hold dem enkeltvis eller som et par i et romslig terrarium med mange gjemmesteder, og hold aldri to hanner sammen.

Avl

KJØNNSMODNING OG KJØNNSBESTEMMELSE

Alder og størrelse ved kjønnsmodenhet er ikke dokumentert for *P. flavipunctatus*. Vent med avl til dyrene er fullt utvokste og hunnen er i god hold.

PARRING

Paring i fangenskap er ikke beskrevet for *P. flavipunctatus*. Hannene i slekten signaliserer med halen og med armhevinger, men hvilken rolle signalene spiller ved paringen, er ikke undersøkt. Følg med på den første kontakten, og skill dyrene hvis hannen jager hunnen vedvarende.

EGGLEGGING OG KULL

Hvor mange egg hunnen legger, og hvor ofte, er ikke dokumentert for arten; hos slektens øvrige arter legges ett hardskallet egg om gangen. Hunnen kan lagre sæd, slik at hun kan legge befruktede egg lenge etter en paring. Gi henne en liten eggleggingskasse med fuktig sand, og sørg for rikelig med kalk.

INKUBASJON

Rugingen er ikke dokumentert for *P. flavipunctatus*, så tallene i boksen (70-90 dager ved 28 °C) er bare en veiledende ramme. Flytt eggene forsiktig, uten å vende dem, til lett fuktig vermikulitt, og hold temperaturen jevn.

OPPDRETT AV UNGER

Oppdrett av ungene er ikke dokumentert. Ungene er veldig små og trenger de aller minste fôrdyrene, som bananfluer og nyklekte sirisser, samt kalk og UVB.

Helse og vanlige feil

Det er ikke dokumentert sykdommer som er spesifikke for *Pristurus flavipunctatus* i fangenskap. De typiske feilene for små, dagaktive ørkengekkoer er:

- For lite UVB og kalk, som kan gi bløte bein og skjelving.
- For høy luftfuktighet og dårlig ventilasjon.
- Overoppheting under en for kraftig lampe uten kjølig område.
- Mistet hale ved stress eller fastholding.

Et friskt dyr er raskt og var med klare øyne. Søk veterinær med erfaring med krypdyr hvis dyret går ned i vekt eller ligger slapt.

Spør alltid dine kloke bekjente

Veiledningen er et godt sted å begynne, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskjellige, og mye av det viktigste lærer man av dem som har holdt arten i årevis. Snakk med en oppdretter, en erfaren holder eller en veterinær med kunnskap om krypdyr og amfibier før du skaffer deg dyret - og igjen hvis noe virker galt.