herpy

GEKKOER

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus er en sjelden, nattaktiv klatrer fra Île des Pins og den lille øya Môrô i Ny-Caledonia, og den føder levende unger. Arten er kritisk truet i naturen og sjelden i fangenskap. Stellet ligner de øvrige *Rhacodactylus*-artene, men dyrene er dyre, vokser langsomt og får høyst to unger i året.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Lesser rough-snouted gecko Tidligere navn: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus* Publisert 16. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**10-14 cm** snute-kloakk-lengde
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Øvet**

STELL

Min. terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H for 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**65-70 %**
Vann	**Vannskål**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter og ferdigfôr**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kjønnsmoden	**36-60 mnd.**
Kullstørrelse	**1-2 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**180 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Arten trives best i et loddrett terrarium på minst 45 × 45 × 90 cm (lengde × bredde × høyde). Det rommer ett til fire dyr, og et større terrarium er alltid en fordel.
TEMPERATUR	Det er ikke målt presise temperaturer for *Rhacodactylus trachycephalus* i naturen, så tallene bygger på erfaringer med arten i fangenskap og med beslektede *Rhacodactylus*-arter. Hele spennvidden ligger mellom 18 og 29 °C.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Luftfuktigheten bør ligge omtrent 65-70 %. Den kan holdes oppe med en levende plante, fuktig sphagnum i et skjul og regelmessig spruting.
LYS OG UVB	Arten er helt nattaktiv og kommer først fram når det er mørkt. Det er ikke påvist at UVB er nødvendig.
FÔRING	Fôret består av levende insekter og et tørt pollen- og nektarfôr til dagaktive gekkoer, som står framme hele tiden. Gi fire voksne sirisser per voksent dyr én gang i uken.
ATFERD OG HÅNDTERING	Arten er rolig, og med regelmessig håndtering blir dyrene tamme og like lette å ta opp som *Correlophus ciliatus*. Dyrene er aktive om natten, så håndter dem om kvelden.
NATURLIG UTBREDELSE	Ny-Caledonia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/rhacodactylus-trachycephalus