herpy

GEKKOER

Rhacodactylus trachyrhynchus

Rhacodactylus trachyrhynchus er en sjelden, nattaktiv trelevende gekko fra Ny-Caledonia med rue skjell på snuten og en uvanlig egenskap: Den føder levende unger, noe som i slekten bare deles med én nær slektning. Arten er sårbar i naturen og bare sjelden sett i terrarier, og veiledningen bygger delvis på erfaringer med de nærmeste slektningene.

Familie: Diplodactylidae Engelsk: Rough-snouted giant gecko Publisert 15. november 2026

FAKTABOKS

DYRET

Voksenstørrelse	**30-38 cm** total lengde inkl. hale
Levealder	**15-20 år**
Aktiv	**Om natten**
Levevis	**Trelevende**
Biotop	**Tørrskog og regnskog**
Vanskelighetsgrad	**Erfaren**

STELL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H for 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Valgfritt**
Kosthold	**Insekter, frukt og ferdigfôr**
Holdes	**Alene, parvis eller én hann med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kullstørrelse	**1-2 unger**
Kull per år	**1**
Drektighet	**150-240 dager**

VERN OG PAPIRER

CITES	**Ikke listet**
EU-vedlegg	**Ikke listet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Stell i korte trekk

TERRARIET	Stellet av *Rhacodactylus trachyrhynchus* er nesten ukjent, så stellrådene er lånt fra den nært beslektede *Rhacodactylus leachianus* og er et forsiktig utgangspunkt.
TEMPERATUR	For *Rhacodactylus trachyrhynchus* er 22-27 °C passende om dagen, og om natten kan det falle til 18-22 °C. Et varmested er unødvendig, fordi arten er nattaktiv og hører hjemme i et mildt klima.
LUFTFUKTIGHET OG VANN	Hold luftfuktigheten for *Rhacodactylus trachyrhynchus* på 50-80 %. Spray terrariet grundig om kvelden, slik at den stiger til 70-80 %, og la den falle igjen i løpet av dagen, slik at bunn og greiner rekker å tørke.
LYS OG UVB	*Rhacodactylus trachyrhynchus* er nattaktiv og klarer seg trolig som slektens øvrige arter uten UVB når fôret inneholder D3-vitamin. UVB er derfor valgfritt.
FÔRING	*Rhacodactylus trachyrhynchus* er trolig altetende som alle *Rhacodactylus*-arter, med insekter og frukt som hovedføde og tilfeldig små krypdyr, fugleunger og gnagere. En blandet kost er derfor utgangspunktet.
ATFERD OG HÅNDTERING	Hannene av *Rhacodactylus trachyrhynchus* slåss ofte hvis de går sammen, mens hunner er sosiale og kan holdes sammen. Hold derfor aldri to hanner i samme terrarium. En hann kan holdes alene eller med en eller to hunner.
NATURLIG UTBREDELSE	Ny-Caledonia.

Hele veiledningen med kart og oppdateringer: herpy.org/no/gekkoer/rhacodactylus-trachyrhynchus